

## ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГНІЙНИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ

*Хоменко О.І.*

*Сумська міська дитяча клінічна лікарня*

Серед інфекційних захворювань нервової системи гнійні менінгіти є найбільше розповсюдженими.

Під нашим наглядом було 75 дітей, які у 2005-2006 рр. захворіли на гнійний менінгіт. Діти 1-го року слали 13,3%. Захворювання частіше виявлялося у хлопчиків, ніж у дівчаток (61,3%, 38,7% відповідно,  $p < 0,05$ ). Діти як дошкільного, так і шкільного віку хворіли на гнійний менінгіт однаково часто (42,6 % і 57,4%,  $p > 0,05$ ).

Початок захворювання у 100% дітей був гострим. Захворювання у 56,0 % дітей розпочиналося з підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, у 22,7 % - до фебрильних і у 21,3 % - до високих фебрильних. Причому у дітей грудного віку гнійний менінгіт частіше розпочинався з підвищення температури тіла до високої фебрильної (30,0%, 10,0 %, 60,0 %). У дітей раннього віку частіше виявлялася субфебрильна температура тіла (83,3% і 16,7%,  $p < 0,01$ ). У дітей дошкільного віку захворювання однаково часто розпочиналося з субфебрильної та фебрильної температури тіла і рідше з високої фебрильної (43,7%, 43,7%, 12,6%,  $p < 0,05$ ). У хворих молодшого шкільного віку достовірно частіше виявлялася субфебрильна температура тіла (62,8%, 18,6%, 18,6%,  $p < 0,05$ ). Крім гарячки в клінічній картині бактеріальних менінгітів виявлялися такі симптоми як головний біль (70%), блювання (75%), стомлюваність, слабкість, в'ялість (24%), запаморочення (4%). Менінгеальні симптоми були позитивними у всіх дітей: симптом ригідності м'язів потилиці - у 87,4% дітей, Керніга - у 50,5%, тоді як симптоми Брудзинського - тільки у кожного четвертого хворого. Черевні рефлекси у 2/3 пацієнтів не виявлялися або були пригнічені.

Діти в основному отримували лікування комбінацією ампіциліну з цефотаксимом (58,7%), 34,7 % дітей - лікування тільки цефотаксимом або іншими антибіотиками (ванкоміцином, цефаболом, цефтумом, урофосфаболом).

Середній ліжко - день склав 20,2 дня, із них у відділенні АІТ – 5,99 дня. Більшість дітей виписувалася з неврологічного відділення з видужанням (95,4%), незначна частина - з залишковими явищами (4,6%).

Отже, гнійні менінгіти у дітей зустрічаються з однаковою частотою в різних вікових групах. Хлопчики хворіють частіше, ніж дівчатка. Клініка менінгіту зберігає свої характерні ознаки, серед яких домінують прояви інфекційно-токсичного синдрому