

## ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «ПРОКСІУМ» (ПАНТОПРОЗОЛ) У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНУ РЕФЛЕКСНУ ХВОРОБУ

*Орловський О.В., Муренець Н.О.; Циган О.М., студ. 4-го курсу  
СумДУ, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти з курсом пропедевтики*

В теперішній час гастроєзофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) є одним з найросповсюджених захворювань гастродуоденальної зони. Захворювання характеризується високою поширеністю та швидкими темпами зростання. Якщо на початкових стадіях патологія має функціональний характер, то з часом відсутність адекватної терапії призводить до прогресування процесу з розвитком структурних змін у стравоході та провокує ряд позастравохідних клінічних проявів.

**Мета роботи:** вивчити клінічну ефективність вітчизняного генеричного пантопрозолу «Проксіум» серед хворих на ендоскопічно позитивну ГЕРХ.

**Матеріали та методи.** Обстежено і проліковано 36 хворих з загостренням ГЕРХ (22 чоловіки та 14 жінок). Проводилась оцінка клінічних та ендоскопічних проявів як до, так і через 4 та 8 тижнів від початку лікування. В якості анти секреторної терапії використовували «Проксіум» (пантопрозол) ВАТ «Лубнифарм» в дозі 40 мг раз на добу протягом 8 тижнів.

**Результати досліджень.** У всіх хворих визначався ендоскопічно позитивний рефлюкс-езофагіт (РЕ). РЕ А ступеню виявлено у 20, В у 12, та С у 4 хворих. Ведучим клінічним симптомом у всіх хворих була печія.

Оцінка клінічного лікування показала, що основні клінічні прояви захворювання були ліквідовані протягом перших днів лікування, в середньому через  $2,2 \pm 0,35$  доби. Через 8 тижнів від початку лікування ендоскопічні симптоми РЕ зникли у всіх хворих, що мали А ступінь. Серед хворих, що мали В ступінь вони збереглися у 2 пацієнтів та відповідали А ст. Серед хворих, що мали С ступінь – у 1 пацієнта відповідали А ст., а у 2 – В ст. Таким чином ліквідація ендоскопічних симптомів РЕ відбулася у 86,1% хворих.

**Висновок.** Препарат «Проксіум» є ефективним анти секреторним засобом при лікуванні хворих на ГЕРХ, який забезпечує швидку редукцію клінічних та ендоскопічних проявів.