

II. За клініко-біохімічними та гістологічними критеріями :

1. Ступені активності :

- а) мінімальна – рівень АЛАТ менше 3 норм ;
- б) слабо виражена – рівень АЛАТ від 3 до 10 норм ;
- в) помірно виражена – рівень АЛАТ від 3 до 10 норм ;
- г) виражена – рівень АЛАТ більше 10 норм.

2. Стадії ХГ (визначаються поширеністю фіброзу та цирозу) :

- 0- фіброз відсутній
- 1- слабо виражений перипортальний фіброз
- 2- помірний фіброз з порто-портальними септами
- 3- виражений фіброз з порто-центральною септами
- 4- цироз печінки , важкість якого оцінюють за важкістю портальної гіпертензії та печінково-клітинної недостатності.

ВНЕЗАПНАЯ КАРДИАЛЬНАЯ СМЕРТЬ И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЖИТЕЛЕЙ КОНОТОПСКОГО РАЙОНА

В.В.Кравец, В.Ф.Петренко

Конотопская центральная районная больница

Наступление внезапной кардиальной смерти (ВКС) во многих случаях связана с наличием артериальной гипертензии (АГ). Значение АГ в патогенезе ВКС, как указывают многие исследователи, может определяться ее влиянием на развитие коронарного атеросклероза и ишемической болезни сердца. Однако ряд факторов не позволяют, несмотря на кажущуюся очевидность, прямо отнести АГ к факторам риска ВКС. Это указывает на то, что вопрос о взаимоотношении АГ и ВКС нуждается в дальнейшем изучении.

Нами в период с 1986-1997 годы изучены 117 случаев летальных исходов от ВКС. Частота АГ определялась как в материале в целом, так и в группах, выделенных на основе различных типов поражения миокарда по общепринятым критериям: 1-я группа - с

мелкоочаговым кардиосклерозом, 2-я - с постинфарктным кардиосклерозом, 3-я - с острым инфарктом миокарда, 4-я - с алкогольной кардиомиопатией. При этом частота встречаемости АГ в разных группах поражения миокарда была в 1-й - 54.3%, 2-й - 35.4%, 3-й - 30.4%, 4-й 9.1%.

Исследования показывают, что среди внезапно умерших лиц артериальная гипертензия составляет 37.6%. Частота АГ по группам ВКС была различной. Чаще всего АГ встречалась в группе умерших с мелкоочаговым кардиосклерозом - 19 (54.3%) случаев. В группе постинфарктным кардиосклерозом - 17 (35.4%), острым инфарктом - (30.4%), алкогольной кардиомиопатией - 1 (9.1%) случаев.

Среди внезапно умерших людей АГ в 41% констатирована в возрасте 50-59 лет.

Таким образом, при ВКС АГ зарегистрирована в 37.6% лиц и встречаемость ее зависит от типа поражения миокарда.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОЙ рН-МЕТРИИ

Кравец В.П.

Конотопская центральная районная больница

Разработка и внедрение новых методов исследования желудочной секреции занимает важное место в функциональной диагностике и лечении язвенной болезни и хронического гастрита, а также функциональных заболеваний желудка.

Базальная топографическая рН-метрия желудка выполнена 225 больным, мужчин было 136 (60.4%), женщин - 89 (39.6%). В структуре обследованных больных язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в том числе - рецидив заболевания) наблюдали у 113 (50.3%) человек, гастриты и гастродуодениты - у 73 (32.4%), холециститы, цирроз печени, панкреатиты,