

# АНАЛІЗ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У СУМСЬКОМУ ОНКОДИСПАНСЕРІ

Вінниченко І.А., Коробейник В.І., Москаленко В.Л.,  
Курочкин А.В.

Кафедра хірургічних хвороб, обласний клінічний онкодиспансер.

За період 1997 - 1999 р. р. у Сумській області зареєстровано 88 хворих на рак щитоподібної залози. Із них чоловіків було 17 (19,3%), жінок 71 (80,7%) віком від 17 до 86 р. (середній вік 55,6 р.). Рак щитоподібної залози 1 стадії встановлено у 12 чоловік (13,5%); 2 стадії – у 40 (5,4%); 3-4 стадії – у 36 (41,1%).

В торакальному відділенні Сумського онкодиспансеру за трьохрічний період знаходилось на лікуванні 25 чоловік з діагнозом рака щитоподібної залози. Із них чоловіків було 5 (20,0%), жінок 20 (80,0%). Субтотальна резекція щитоподібної залози проведена у 16 (64,0%) пацієнтів. Із них у 3-х чоловік операція доповнена фасціально-футлярним видаленням лімфовузлів шиї на стороні ураження; у одного хворого - операцією Крайля; і ще у одного - комбінованою операцією з резекцією тіла під'язичної кістки. Екстирпація щитоподібної залози виконана у 6 пацієнтів, із них у 2-х вона доповнена фасціально-футлярною лімфаденектомією шиї з обох боків ; у одного таке втручання доповнено видаленням лімфовузлів шиї з видаленням лімфовузлів переднього середостіння шляхом часткової стернотомії. Оперовано 3 хворих з рецидивною пухлиною щитоподібної залози: у двох - проведена екстирпація щитоподібної залози з фасціально-футлярною ексцизією лімфовузлів шиї і видаленням лімфовузлів верхнього середостіння після серединної стернотомії ; у одного - розширена екстирпація щитоподібної залози. Відслідовани віддалені результати.