

импульс прямоугольной конфигурации во времени. Сначала рассматривается гармоническое возбуждение слоя с полостью, затем при помощи интегрального преобразования Лапласа рассматривается импульсное возбуждение. Границная задача сводится к интегральному уравнению Фредгольма 2-го рода. Обращение преобразования Лапласа проводится численно. Получены результаты, характеризующие реакцию слоя с полостью на тепловой импульс.

ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА СВЯЗАННОЙ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ ПЛАСТИНКИ С ОТВЕРСТИЕМ

Силич К.В.

Рассматриваются связанные тепловые и механические поля в пластинке с учетом конечности скорости распространения тепловых возмущений. На основе построенного двумерного фундаментального решения граничная задача для пластиинки с отверстием сводится к системе интегральных уравнений, которая решается численно методом механических квадратур. Получены данные по концентрации связанных полей на контуре отверстия.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВОЛН В АНИЗОТРОПНОМ СЛОЕ

Чеканов А.А.

Рассматривается анизотропный в смысле теплофизических свойств слой, содержащий тунNELьную полость на поверхности которой задан гармонически изменяющийся во времени тепловой поток. На основе построенных однородных решений уравнения теплопроводности для анизотропного слоя указанная граничная задача сводится к регулярному интегральному уравнению второго рода. Это уравнение решается численно методом механических квадратур. Построены линии уровня температур в окрестности полости, дающие представление о концентрации волновых тепловых полей вблизи неоднородности.