

С. О. Грищенко
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРАСНУХИ
КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4», м. Суми

Актуальність. Не зважаючи на епідеміологічну стабілізацію в країні, краснуха все ще має широке розповсюдження і до сих пір зберегла риси некерованої інфекції. Це пов'язано, перш за все, з перебоями в постачанні вакцини та негативізмом з боку засобів масової інформації.

Мета роботи. Вивчити клініко-епідемічні особливості перебігу краснухи за період 2010-2012 року.

Основна частина. Аналіз захворюваності на краснуху приведено на рис. 1. Кількість хворих на 100000 населення зменшувалася протягом останніх трьох років, причому захворюваність по місту більше, ніж в цілому по області. Однак слід пам'ятати, що краснуха в більшості випадків перебігає безсимптомно або в стертій формі і не завжди ідентифікується.



Рис. 1 – Аналіз захворюваності на краснуху

З підозрою на краснуху до інфекційного відділення КУ СМКЛ № 4 за період з 2010 по 2012 рік госпіталізовано 25 осіб, але вірусологічне підтвердження діагнозу було отримано лише у 16 пацієнтів. Більше 81 % хворих склали чоловіки. Досліджували кров методом ІФА ІgM з 4-го дня після появи висипки у вірусологічній лабораторії обл. СЕС та лабораторії СІНЕВО. У всіх хворих був середньотяжкий перебіг захворювання. Спостерігається зимово-весняна сезонність захворювання. У період з січня по травень реєструється більше 70 % випадків. Середній вік пацієнтів – 21 рік. Всі хворі були не щеплені.

Висновок. Захворюваність на краснуху у Сумській області має тенденцію до зменшення. Активізація інформаційно-освітньої роботи серед населення, особливо в засобах масової інформації, пропаганда імунізації сприятиме попередженню поширення захворювання у населення, особливо у жінок дітородного віку.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, м. Суми, 19-20 червня 2013 р. / Редкол.: М.Д. Чемич, Г.М. Дубинська, К.І. Бодня, Н.І. Ільїна, В.В. Захлебаєва. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 30-31.