

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України  
Міністерство охорони здоров'я  
Сумський державний університет  
Медичний інституту



# АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Topical Issues of Clinical and Theoretical  
Medicine

**Збірник тез доповідей**  
III Міжнародної науково-практичної конференції  
Студентів та молодих вчених  
(Суми, 23-24 квітня 2015 року)

Суми  
Сумський державний університет  
2015

**Выводы:** таким образом, результаты исследования свидетельствуют об наибольшей эффективности и целесообразности совместного приёма статинов (Аторвастатин, 10 мг/сутки) и УДХК (10мг/кг в сутки).

## КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЛОБЭКТОМИИ

*Хабаль А.В.*

*Научный руководитель – доц.Химич Т.Ю.*

*Харьковский национальный медицинский университет, кафедра ПБМ№2*

Одной из форм воспаления легочной ткани является абсцесс легкого. Данная патология чаще встречается у мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Несмотря на то, что количество пациентов за последние 50 лет уменьшилось практически в 10 раз, случаи летального исхода сократились всего на 10%. При отсутствии эффекта от консервативных методов лечения проводится оперативное лечение, которое применяется в 60% случаев. Лобэктомия— одна из наиболее часто выполняемых операций в торакальной хирургии (57,5% всех видов операций на паренхиме легкого).

**Цель:** изучение качества жизни, функции внешнего дыхания у лиц после лобэктомии проведенной по поводу абсцесса легкого.

**Материалы и методы:** Качество жизни было изучено с помощью анкеты Святого Георга (SGRQ), оценка функции внешнего дыхания проводилась с помощью спирометрии на спирометре Microlab.

**Результаты:** Обследовано 5 больных, которым была проведена лобэктомия, в связи с формированием абсцесса легкого. Средний возраст больных составил  $43,6 \pm 5,3$  лет. Независимо от срока после операции у больных жалобы на одышку, снижение работоспособности. Проведенный анализ шкал вопросника SGRQ выявил в 87 % изменения по шкале «симптомы», в 93 % изменения по шкалам «активность» и «влияние», максимальное количество баллов зафиксировано по шкалам «активность» -  $77,9 \pm 4,8$  и «суммарный балл» -  $77,1 \pm 3,5$ , что свидетельствует о затруднении при быстрой ходьбе, необходимости часто останавливаться, о невозможности заниматься теми видами деятельности, какими хотелось бы, о невозможности продолжать работу. При исследовании ФВД выявлены обструктивные нарушения в 45,5% случаев.

**Выводы:** качество жизни у пациентов после лобэктомии в значительной степени детерминировано уровнем компенсации аэростаза: от хорошей до плохой, параметры всех шкал здоровья ухудшаются, падает уровень самооценки. Также, можно судить о проблеме психологического восприятия болезни, так как было обнаружено, что у лиц которые с легкостью относились к перенесенной операции наблюдались более высокие показатели как физического так и психического здоровья.

## A CASE OF SEVERE FIELD CANCERIZATION IN AN 82-YEAR-OLD IMMUNOSUPPRESSED MAN

*I.Lata, L.Derevyanko, B.Lytvynenko, P.Petrenko, L.Kirpichova,  
Clinical Hospital "Feofaniya" Kyiv, CSD Health care*

We present a tough case of multiple squamous cell carcinomas (SCC) and field cancerization of the scalp that required extensive examination and complex treatment. The lesions started 6 years ago on the sites of previously diagnosed actinic keratosis (head, neck, ears). The patient had two cases of BCCs in his medical history. He also suffered from rheumatoid arthritis and during 5 years was taking 15 mg/week methotrexate without any follow up or blood test.

During clinical examination the patient had multiple nodulo-erosive plaques with thick adherent scales on the scalp mostly on the fronto-parietal area. Multiple hyperkeratotic suspected actinic keratosis were present in between these plaques. Punch biopsy of a single lesion revealed