

Міністерство освіти та науки України
Сумський державний університет
Медичний інституту



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

Topical Issues of Clinical and Theoretical
Medicine

Збірник тез доповідей
IV Міжнародної науково-практичної конференції
Студентів та молодих вчених
(Суми, 21-22 квітня 2016 року)

ТОМ 2

Суми
Сумський державний університет
2016

ХСН, тобто це дає реальний шанс на основі використання даних груп препаратів реально продовжити життя пацієнтів в сучасних реаліях.

ГОСПІТАЛЬНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ХВОРИХ, АСОЦІЙОВАНИХ З НАСЛІДКАМИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Лаба В.В., Коболева А.Є.

Сумський державний університет, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти

Медико-соціальні наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС набувають особливого змісту внаслідок прояснення масштабів і сутності процесів радіаційної патології. Різні категорії населення мають різні особливості ураження. Ті, хто проживав і був відселений, або проживає на забруднених територіях, відчули на собі вплив хронічної дії радіації, а які отримали такі ж самі дози опромінення за короткий проміжок часу, як задіяні до ліквідації наслідків катастрофи, – отримали масивний вплив негативного чинника.

Матеріали і методи дослідження. Зроблено аналіз 1197 карт хворих, що лікувались в терапевтичному відділенні обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. Досліджено відповідність обстеження і лікування згідно вітчизняних стандартів. Проаналізовано результати проведеного перебування пацієнтів в стаціонарі.

Результати дослідження та їх обговорення. Протягом досліджуваного 2015 року в терапевтичному відділенні проліковано 1206 пацієнтів, з них чоловіків – 69,7%, жінок – 30,3%. Чорнобильський контингент склав 67,08% хворих, з них – інвалідів – 30,7%. Переважали ліквідатори – 52,1%, відселені – 13,3%, решта – евакуйовані – 1,2%. Серед пролікованих – працездатних – 47,9%, пенсіонерів – 52,1%. Перше місце склав клас хвороб системи кровообігу – 57%, з них: ішемічна хвороба серця – 42,7%, стенокардія – 17,6%. На другому місці за частотою госпіталізації були пацієнти з хворобами органів травлення – 18,1%, на третьому – хвороби органів дихання – 9% і на останньому – ендокринні захворювання – 4,1%. З покращенням виписано – 96,2% пацієнтів, з одужанням – 1,8%, без змін – 1,4%, переведено в інші стаціонари – 0,4%. Летальність склала – 0,67%. Пацієнти отримували необхідне обстеження і лікування згідно вітчизняних стандартів. Пропускна здатність ліжка склала 101,5%, середнє число зайнятості ліжка – 345, середня тривалість перебування на ліжку – 14,3 дня, середній оберт ліжка 24,1 дня.

Висновок. У осіб чорнобильського контингенту найпоширеною є серцево-судинна патологія, в меншій мірі – хвороби інших класів, що є наслідком різних видів негативного впливу іонізуючої радіації і стресового чиннику.

СТРУКТУРА СТАЦІОНАРНИХ ХВОРИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО КОНТИНГЕНТУ КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Лаба В.В., Побивайло А.С.

Сумський державний університет, кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти

Атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС) та гіпертонічна хвороба (ГХ) – це хвороби століття, які домінують у структурі захворюваності і смертності, маючи велике соціальне і клінічне значення. Серед усіх причин смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК) до 70% припадає на ІХС. Виходячи з наведеного, та зважаючи на 30-річний післячорнобильський період, а також враховуючи коморбідність патології у осіб старше 50 років, особливо чоловічої статі, являє певний інтерес аналіз госпіталізованих хворих з високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком.

Метою дослідження було вивчення структури хворих, що перебували на курації протягом 2015 року, а також аналіз середньої тривалості перебування на ліжку, летальності та ін.

Матеріали і методи дослідження. Проаналізовано 151 історію стаціонарних хворих кардіологічного відділення обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту

населення (19% від всіх), що перебували на лікуванні. Всі пацієнти були чоловічої статі в віці 54-68 рр.

Результати дослідження та їх обговорення. Серед пацієнтів переважаючою була категорія з ІХС, стабільною стенокардією і супутньою ГХ – 58 (38,4%). Другою за частотою була група хворих з ІХС, кардіосклерозом атеросклеротичним і супутньою ГХ – 46 (30,46%). Наступною була частка хворих з атеросклеротичною хворою серця – 20 (13,24%), близькою до неї була група пацієнтів з іншими формами стенокардії – 19 (12,58%). Пацієнти з ГХ і переважаючим ураженням серця без хронічної серцевої недостатності склали всього 5 (3,31%). По 1 пацієнту (0,66%) було госпіталізовано з дилатаційною кардіоміопатією, ревматичною хворобою аортального клапану і іншими хворобами аортального клапану. Всі пацієнти отримували стандартне лікування згідно вітчизняних клінічних протоколів і рекомендацій. Усереднений показник перебування на ліжку склав 11,1 ліжка/дня, що нижче середнього значення по відділенню на 2,1 дня. Померлих пацієнтів не реєструвалось.

Висновки. Основними нозологіями, що формують зайнятість спеціалізованого загальнокардіологічного ліжка у постчорнобильського контингенту є ІХС в формі стенокардії і атеросклеротичного кардіосклерозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією, що складає 87,1%. Отримані результати відповідають загальним тенденціям клініко-соціального значення.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОШИРЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД МОЛОДІ М. ВІННИЦЯ

Лагно Є.С.

Науковий керівник: доцент, кандидат медичних наук Вільцанюк О.О.

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Актуальність: В Україні щорічно від наркоманії, алкогольної залежності та куріння і пов'язаних з ними хвороб помирає до 120 тисяч осіб. Більше 15% населення України страждає від алкоголізму, щорічно помирає 40 тис. людей.

Мета: провести дослідження поширеності шкідливих звичок серед студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці.

Об'єкти та методи: Об'єктом дослідження виступили 150 студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці. Із цих 150 студентів було 68 чоловіків (45,3%) та 82 дівчини (54,7%). В анкетуванні взяли участь студенти віком від 16 до 28р. Для збору даних була використана анкета для анонімного опитування, що складається з 25 питань.

Результати дослідження: Згідно з дослідженням 100% респондентів пробували алкоголь. Слід зазначити, що частіше вживають алкоголь студенти 1 та 5-го курсу.

Згідно з отриманими даними курити не пробував 61 респондент (40,6%). Із 89 опитаних студентів, що палять 49 чоловіків (72,5%) та 40 жінок (48,8%). Студенти, які палять нерегулярно, в середньому викурюють 12,2 сигарети в місяць, які палять щодня – 10,6. 55 із 150 підтвердили вживання наркотиків із них 31 чоловік (56,4%) та 24 жінки (43,6%). В цілому, коли-небудь пробували наркотики 36,7% опитаних, хоча 11,5% з них мали пропозиції спробувати повторно. На питання "Чи є у вас знайомі, які вживають наркотики?" позитивно відповіли 27,2% студентів.

Висновки. Враховуючи отримані данні про невтішну статистику шкідливих звичок студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці, з метою профілактики розвитку шкідливих звичок та їх ускладнень серед студентства і формування здорової нації необхідно популяризувати установку на здоровий спосіб життя серед учнівської молоді.