

## **АУТОАГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА У ХВОРИХ З ДЕБЮТОМ ШИЗОФРЕНІЇ**

*Мудренко І.Г., лікар – психіатр, аспірант*

*Науковий керівник – д-р мед.наук, проф. Сміян О. І.*

*Сумський державний університет ,кафедра педіатрії №1*

Метою проведеного дослідження було вивчення аутоагресивної поведінки у хворих з маніфестним психозом шизофренії на етапі першої госпіталізації до психіатричного стаціонару.

В умовах гострого психіатричного відділення Сумського обласного психоневрологічного диспансеру було обстежено 18 пацієнтів з першим психозом шизофренії.

Виявилось , що основну масу обстежених (93,3%) складають особи найбільш працездатного віку ( від 20 до 50 років ) , (50 %) чоловіки та (50%) жінки . У переважній більшості пацієнтів (72,2%) діагностовано параноїдну форму шизофренії , у (16,6%) просту , порівну по (5,5%) – кататонічну і шизоафективну форми. Суїцидальні думки висловлювали

(55,5%) обстежених , безпосередньо перед надходженням до стаціонару суїцидальну спробу скоїли (38,8%) хворих .Серед способів здійснення суїциду в данній групі переважали отруєння лікарськими речовинами та самопорізи – по 42,8%, химерні спроби (татування , схильність до хірургічних втручань , відмова від їжі , тощо) склали - 14,4% . Результати клініко – анамнестичного дослідження показали ,що суїцидальна поведінка при дебюті шизофренії визначається психопатологічною симптоматикою , «психологічно зрозумілими переживаннями» на тлі зміни мотиваційної сфери .

У клінічній картині найчастіше відмічались розлади сприйняття у вигляді псевдогалюцинацій , маячні ідеї відношення , переслідування , депресивний афект . Абсолютна більшість обстежених намагались пояснити свій стан психотравмуючими факторами .