

## ПРИЧИНИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ТА АБОРТІВ

*Сумцов Г.О., доцент*

*СумДУ, кафедра акушерства та гінекології*

Проведено вивчення причин та результатів лікування тяжких гнійно-септичних ускладнень після пологів та абортів за останні 10 років за матеріалами СОЦАГР. За цей період проліковано 30 жінок віком від 17 до 38 років із наступними тяжкими ускладненнями: перитоніт після кесаревого розтину у 17 ( $56 \pm 9\%$ ), сепсис у 9 ( $30 \pm 9\%$ ) та токсико-септичний шок у 4 ( $13 \pm 6\%$ ) хворих.

З'ясовано, що у  $80 \pm 9\%$  жінок вагітність перебігала на фоні хронічних, часто поєднаних захворювань, таких як анемія, кольпіт, хронічний пієлонефрит, варікозна хвороба, цукровий діабет. Поєднана прееклампсія була у половини вагітних. Пологи ускладнилися раннім або передчасним виливом навколоплідних вод і слабкістю пологової діяльності відповідно у 50 і 55% роділь.

Причинами септичних ускладнень після фізіологічних пологів були залишки плацентарної тканини. Фоном для гнійно-септичних ускладнень після абортів також послужили анемія, пієлонефрит, гломерулонефрит або кримінальні втручання.

Після проведення радикальних операцій (екстирпація матки з трубами, дренавання) та інтенсивної багатокомпонентної терапії в післяопераційному періоді усі хворі виписані з одужанням.

Отже, гнійно-септичні ускладнення після пологів та абортів провокуються широким спектром факторів і виникають навіть в пізні терміни. Ризик підвищується на ґрунті хронічних екстрагенітальних захворювань, прееклампсії та хірургічних втручань.