

ЯК ВПЛИВАЄ ТЯЖКА БРОНХІАЛЬНА АСТМА НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ ШКОЛЯРІВ?

Гарас М.Н., Богуцька Н.К.

*Науковий керівник – проф. Л.О. Безруков
Буковинський державний медичний університет,
кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб*

Метою роботи було порівняти стан емоційної сфери дітей шкільного віку, хворих на тяжку і середньотяжку персистувальну бронхіальну астму (БА).

Матеріал і методи. У пульмонологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні м.Чернівці з дотриманням вимог біоетики обстежено 18 дітей шкільного віку із верифікованим діагнозом тяжкої персистувальної бронхіальної астми (І група) та 18 дітей із середньотяжким варіантом патології (ІІ група). Усім дітям у позаприступному періоді проведено комплексне клінічно – параклінічне обстеження, а також визначення якості життя за бальним опитувальником Е.Джуніпер, адаптованим для України. Оцінка якості життя проводилася дискретно за складовими опитувальника, в т.ч. оцінка емоційної сфери.

Результати дослідження. Встановлено, що в дітей І групи стан емоційної сфери оцінювався у $34,4 \pm 2,73$ бали, водночас, у школярів ІІ групи - у $42,4 \pm 2,71$ бали ($p < 0,05$). У школярів із тяжкою персистувальною БА для стану емоційної сфери однаково вірогідно значима була частота як денних ($r = 0,72$, $p < 0,05$), так і нічних симптомів ($r = 0,59$, $p < 0,05$). Водночас у пацієнтів ІІ клінічної групи емоційного забарвлення вірогідно набували тривалі загострення захворювання ($r = 0,61$, $p < 0,05$).

Висновок. Школярам із тяжкою персистувальною БА притаманний вірогідно більший емоційний дискомфорт в порівнянні з дітьми із середньотяжким перебігом. Зміни в емоційній сфері дітей із тяжкою БА пов'язані з кратністю денних та нічних симптомів, а у пацієнтів із середньотяжким варіантом - із частотою загострень захворювання.