

СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ДІТЕЙ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

*Кривцун С.І., Лаба О.Б. Сипченко Л.О.
Сумська міська дитяча клінічна лікарня*

Незважаючи на стабілізацію деяких епідеміологічних показників, епідемія туберкульозу в Україні продовжує поширюватись.

Захворюваність на туберкульоз органів дихання (76,9%) складає основну частку всіх вперше виявлених форм туберкульозу. Із загальної кількості вперше виявлених дітей із туберкульозом органів дихання серед дітей м. Суми та області в фазі розпаду не виявлено ні однієї дитини, тоді як у 2003 році в м. Суми була виявлена 1 дівчинка з деструкцією легеневої тканини. В Україні в 2003 р. було діагностовано 29 (5,7%) дітей з туберкульозом органів дихання в фазі розпаду.

Серед усіх вперше виявлених дітей було 6 (46,2%) дівчаток і 7 (53,8%) хлопчиків. Діти до 4-х років склали - 15,4%, від 5 до 10 років - 15,4%, від 10 до 12 років - 15,4%, 13 років і старше - 38,5%. При профілактичному огляді в області виявлено 38,5%, по м. Суми - 60,0% дітей (по Україні в 2003 р. - 55,8%).

У Сумській області на першому місці в структурі захворюваності знаходиться ексудативний плеврит (46,2%), на другому місці - туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (23,1%), кістково-суглобовий туберкульоз (23,1%), на третьому - первинний туберкульозний комплекс (7,7%).

Отже, всі форми туберкульозу органів дихання як в області, так і по м. Суми виявлені вчасно. Хворіють діти на туберкульоз усіх вікових категорій, дівчатка і хлопчики з однаковою частотою. Найчастіше зустрічаються нерозповсюджені форми: туберкульозний плеврит, туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Залишається великою проблемою кістково-суглобовий туберкульоз, так як цю форму туберкульозу надзвичайно важко виявити вчасно, і великий відсоток дітей саме з цією патологією мають інвалідність.