

**АНАЛІЗ ЛЕТАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІКАРНІ м.  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА  
ЗА ПЕРІОД 1986 – 2004 рр.**

*Ходан В.В., студ. 5-го курсу*

*Науковий керівник – доцент Библиук Й.І.*

*Івано-Франківська державна медична академія*

*Курс дитячої хірургії*

Проведено аналіз летальних випадків в хірургічному відділенні ДОДКЛ за період з 1986 по 2004 років. Згідно проведеного дослідження померло 216 хворих дітей з хірургічною патологією. За період спостереження з 1986 по 1995 рік померало від 10 до 28 дітей, починаючи з 1996 по 2004 року виявлено значне зменшення летальності до 4 випадків за рік. В залежності від причин смерті виділено слідуєчі групи: вроджені вади шлунково-кишкового тракту, органів дихання, органів сечовивідної системи (110 випадків, що становить 54,19%); невідкладні набуті хірургічні захворювання – апендицит, інвагінація, злукова кишкова непрохідність, патологія дивертикула Меккеля, защемлена пахова грижа (29 випадків – 14,29 %); гнійно-септичні захворювання – виразково некротичний ентероколіт новонароджених, сепсис новонароджених, гострий гематогенний остеомієліт, бактеріальна деструкція легень, некротична флегмона – (36 випадків -17,73 %); інші захворювання – новоутворення (15 випадків - 7,39 %), травматичні пошкодження в тому числі кишки, післяопераційний геморагічний синдром, опікова хвороба, тромбоз сплено-портального стовбуру (13 випадків - 6,4 %). На основі проведеного дослідження значне зниження летальних випадків пов'язано: з відкриттям реанімаційного відділення новонароджених у 1995 році; покращення ранньої діагностики патології новонароджених дітей; поява новітніх методик хірургічного лікування та застосування їх у практичній діяльності.