

НЕОБХІДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ ПРИ ПІДОЗРІ НА ПАРЕНТЕРАЛЬНІ ГЕПАТИТИ

Гайворонська І.Е.

Сумська обласна клінічна інфекційна лікарня ім. З.Й.Красовицького

На сучасному етапі поряд із зростанням захворюваності на парентеральні вірусні гепатити збільшується необхідність обстеження пацієнтів з хронічними захворюваннями шлунково – кишкового тракту та гепатобіліарної системи, тому лікар- терапевт (гастроентеролога) повинен бути насторожений при обстеженні пацієнтів, які звертаються до нього за допомогою.

При підозрі на захворювання печінки хворий повинен пройти лабораторне обстеження. Насамперед це є біохімічний аналіз крові, безпосередньо – печінкові проби.

Другим етапом обстеження є визначення специфічних маркерів гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу ІФА: HbsAg, anti- HBcor Ag, anti-HCV.

Групи осіб, які підлягають обов'язковому обстеженню на маркери вірусних гепатитів: особи, які мали оперативні втручання, трансфузію крові та її препаратів, які вживають внутрішньовенно наркотики, знаходяться на гемодіалізі; медичні працівники; особи комерційного сексу; хворі на венеричні захворювання; діти HbsAg – та anti-HCV - позитивних батьків або навпаки.

Наступним, більш чутливим та точним методом дослідження є полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), за допомогою якої визначають рівень вірусемії.

При позитивних результатах ІФА та ПЛР хворому обов'язково потрібно звернутися до інфекціоніста.

Висновок: при виявленні HbsAg - та anti-HCV - позитивного члена сім'ї всі члени родини повинні бути обстежені (в м. Сумах це можна зробити в Гепатоцентрі – консультативна поліклініка на базі Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні).