

**НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ**

Беседа Я.В., клинический ординатор

Научный руководитель - проф. Асмолов А.К.

*Одесский государственный медицинский университет,
кафедра фтизиопульмонологии*

Актуальность повышения эффективности лечения туберкулеза легких обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации по туберкулезу во всем мире. Заболеваемость всеми формами активного туберкулеза по Одесской области в 2005 году составляет 95.3 на 100 тыс. населения, из них деструктивные формы 41.9 на 100тыс.населения (рост на 7.6%) Целью исследования является изучение возможностей использования препаратов серии «Биотроф» для повышения эффективности лечения больных при наличии одно- или двусторонней деструкции в легких. В качестве лечебных средств как патогенетическое звено комплексного лечения туберкулеза, помимо 4-5 химиопрепаратов согласно приказу МЗ Украины № 499 от 28.10.2003г., использовались Украинские препараты серии «Биотроф». Под наблюдением находилось 68 человек с деструктивными формами туберкулеза. Больные были разделены на две группы – основную 34 (в комплексной терапии использовались препараты «Биотроф») и контрольную – 34 чел.

Рассматривались сроки рассасывания и уплотнения очаговых и инфильтративных изменений; заживление деструктивных изменений; сроки негативизации мокроты; характер остаточных изменений. Применение препаратов серии «Биотроф» позволяет сократить сроки абактериальности мокроты, заживления деструктивных изменений в легких, уменьшить токсическое влияние противотуберкулезных препаратов на функцию печени, а так же добиться уменьшения остаточных изменений в легких после основного курса химиотерапии.