

ТРАНСУРЕТРАЛЬНА РЕЗЕКЦІЯ ЗВУЖЕННЯ СЕЧІВНИКА У ЧОЛОВІКІВ

Байло О.В., аспірант

Науковий керівник – проф. Возіанов С.О.

Інститут урології АМН України,

відділ рентген-ендоурології і літотрипсії

Вивчено результати лікування звернень сечівника з використанням трансуретральної резекції звуження у 119 хворих на звуження сечівивідного протоку віком від 17 до 80 років. Для виконання втручання застосовувався резектоскоп фірми "Циркон" з подвійним струменем рідини. Операція проводилась під спинно-мозковим знеболюванням. Після втручання в сечовому міхурі залишався катетер Фолея № 20-22 на 14-21 добу. Основними показаннями для втручання були протяжність звуження сечівника і часовий фактор – час від моменту утворення звуження до моменту оперативного лікування. Мінімальний термін – не менше 4 місяців. Повна гістологічна організація рубця – запорука повноти успіху трансуретрального втручання. Вивчення найближчих і віддалених результатів лікування показало, що у всіх хворих відновилось самостійне сечовипускання, нормалізувались показники урофлоуметрії, покращилась якість життя.

Із ускладнень відмічено гострий епідіміт у 3, рецидив надлобкової сечової нориці – у 4, невтримання сечі – у 5, помірна уретрорагія – у 3 хворих.

Проведений аналіз показав, що трансуретральна резекція являється ефективним методом лікування. Перевагою метода є невелика тривалість втручання, мала травматичність, можливість повторного виконання у випадку рецидива захворювання.