

О ПРОБЛЕМЕ ВЫВОРОТА МАТКИ

*Сумцов Г.А., Сумцов Д.Г., Красько В.П.**

*СумДУ, кафедра семейной медицины с курсом эндокринологии,
Роменская ЦРБ, Сумской области

Выворот матки является редкой, но чрезвычайно тяжелой акушерско-гинекологической патологией, часто требующей не только срочной, но и высококвалифицированной помощи. Чаще встречается выворот матки во время родов, но может встречаться и без беременности на фоне рождающихся опухолевых узлов матки. По литературным данным осложнение встречается в одном случае на 135-450 тыс. родов. За годы практики мы наблюдали 7 случаев выворота матки, из них 5 во время родов и 2 при лейомиомах матки. За годы практики родов многими авторами рекомендуется вправление матки, описаны методики. К сожалению это не простая манипуляция, так как нам удалось провести вправление матки в двух наблюдениях из 5-ти, а в остальных случаях родильниц пришлось оперировать. Операция типа Кюстнера-Никколи с сохранением матки проведена одной пациентке, остальным – трансвагинальная экстирпация матки без придатков. В двух случаях онкогинекологических выворотов (при опухолях матки), учитывая клинические особенности и возраст больных, произведены экстирпации матки с придатками. Во всех наших наблюдениях исход благоприятный.

Клинически каждое наблюдение сопровождалось кровотечением и кровопотерей во время массивной с геморрагическим шоком, особенно акушерские случаи. По этим причинам лечению предшествовали интенсивные подготовительные мероприятия по восстановлению ОЦК и гемодинамики. В онкогинекологических наблюдениях кровопотеря не была острой, хотя гемоглобин был снижен до 80-90 г/л. В обоих случаях диагноз до операции не был поставлен, так как клиника и данные гинекологического обследования были типичными для рождающихся фиброматозных узлов. Не былостораживающих и характерных клинических проявлений и в акушерских наблюдениях.

Поднятую проблему считаем актуальной, особенно в связи с современной тенденцией активного ведения послеродового периода и игнорированием осмотра родовых путей в зеркалах. Это чревато не только возможностью провоцирования выворота матки, но и несвоевременностью распознавания осложнения.