

Таким чином, в останні роки спостерігається зниження захворюваності на ВГА і збільшення питомої ваги парентеральних гепатитів в загальній структурі ВГ.

## **СТРАТЕГІЯ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ - СКЛАДОВА ЗАХОДІВ НЕДОПУЩЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СНІДУ**

Трецька Т.О.

Сумський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу

З 1995 р. ін'єкційні споживачі наркотиків стали в Україні найбільш ураженою ВІЛ-інфекцією /СНІДом/ групою населення.

Цільова програма дій, спрямованих на профілактику зараження ВІЛ, вірусами гепатитів В і С, ХППП серед ін'єкційних наркоманів, а також на зменшення шкоди від ін'єкційного вживання наркотиків, отримала універсальну назву «Зниження шкоди від вживання наркотиків». Вона активно реалізується в багатьох країнах світу, в т.ч. і в Україні. Розпочинається її проведення і в Сумській області.

Законом України від 3.03.98р гарантована організація заходів по профілактиці розповсюдження СНІДу серед ін'єкційних наркоманів, в т.ч. шляхом створення умов для заміни використаних шприців на стерильні (стаття 4).

Забезпечення виконання цієї гарантії держави крім фінансових труднощів потребує постійного інформування виконавчих органів, формування суспільної думки щодо необхідності проведення такої роботи та її завдань серед цієї цільової групи.

Вживачі наркотиків - інтегральна частина суспільства. Для захисту здоров'я всього суспільства, в першу чергу від СНІДу, необхідно захищати здоров'я споживачів наркотиків. Для цього потрібно інтегрувати їх в суспільство, а не намагатися без успіху ізолюватися від них.