

# ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ ЗА ДАНИМИ СОКЛ

Шаповал В.В.

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Проблема вірусних гепатитів продовжує залишатися актуальну. Це зумовлено, зокрема, можливістю формування хронічних форм хвороби з переходом у цироз печінки і гепатоцелюлярну карциному. В зв'язку з цим найбільшого значення набувають гепатити В і С.

Проаналізовано захворюваність на вірусні гепатити в СОКЛ за 1999 р. Тенденція до зниження захворюваності на ВГА спостерігається з 1996 року і в 1999 році склала 47 випадків. Діагноз було встановлено на основі клініко-епідеміологічних даних. Маркери вірусного гепатиту не визначалися внаслідок відсутності тест-систем.

Етіологічна розшифровка ГВ і ГС проводилася імуноферментним аналізом (ІФА) з визначенням у сироватці крові маркерів вірусів (HBsAg, анти-HBсог, анти-HBсогIgM, анти-HCV). Захворюваність на ВГВ у 1999р. склала 56 випадків. Діагноз встановлений на основі клініко-епідеміологічних даних та імуноферментного аналізу. В 100% випадків діагноз підтверджений наявністю HBsAg в сироватці крові. У 4% хворих на ВГВ визначалися гострофазові анти-HBсог IgM, які підтвердили гострий перебіг ГВ. У 9% хворих виявлені анти-HBсог сумарні, з них тільки у 5% був виявлений HBsAg .

Діагноз вірусного гепатиту С у 1999 році було встановлено 3 хворим, що підтверджено знаходженням анти HCV в сироватці крові. Враховуючи те, що внаслідок відсутності тест-систем це обстеження майже не проводилося, вважаємо що хворих було значно більше. У 3 хворих мала місце мікст-форма гепатиту В і С. Спостерігалася поліморфність клінічних проявів, що викликало певні труднощі в діагностиці. В сироватці крові цих хворих визначено HBsAg та анти-HCV.

Таким чином, в останні роки спостерігається зниження захворюваності на ВГА і збільшення питомої ваги парентеральних гепатитів в загальній структурі ВГ.

## **СТРАТЕГІЯ ЗМЕНШЕННЯ ШКОДИ ВІД ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ - СКЛАДОВА ЗАХОДІВ НЕДОПУЩЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СНІДУ**

Трецька Т.О.

Сумський обласний центр профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу

З 1995 р. ін'єкційні споживачі наркотиків стали в Україні найбільш ураженою ВІЛ-інфекцією /СНІДом/ групою населення.

Цільова програма дій, спрямованих на профілактику зараження ВІЛ, вірусами гепатитів В і С, ХППП серед ін'єкційних наркоманів, а також на зменшення шкоди від ін'єкційного вживання наркотиків, отримала універсальну назву «Зниження шкоди від вживання наркотиків». Вона активно реалізується в багатьох країнах світу, в т.ч. і в Україні. Розпочинається її проведення і в Сумській області.

Законом України від 3.03.98р гарантована організація заходів по профілактиці розповсюдження СНІДу серед ін'єкційних наркоманів, в т.ч. шляхом створення умов для заміни використаних шприців на стерильні (стаття 4).

Забезпечення виконання цієї гарантії держави крім фінансових труднощів потребує постійного інформування виконавчих органів, формування суспільної думки щодо необхідності проведення такої роботи та її завдань серед цієї цільової групи.

Вживачі наркотиків - інтегральна частина суспільства. Для захисту здоров'я всього суспільства, в першу чергу від СНІДу, необхідно захищати здоров'я споживачів наркотиків. Для цього потрібно інтегрувати їх в суспільство, а не намагатися без успіху ізолюватися від них.