

ну: «ничего снаружи, все внутри». Именно так высказывались о выстреле в упор судебные медики в старину. На наш взгляд сохранность факторов близкого выстрела была обеспечена с одной стороны, замкнутым пространством (деревянный гроб), что исключало воздействие механических и химических воздействий почвы, а с другой стороны твердая мозговая оболочка препятствовала взаимодействию продуктов гниения с копотью.

Секція неврології

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ І СМЕРТНІСТЬ ВІД ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ф.Г. Коленко, В.В. Джепа, О.І.Коленко

Курс нервових хвороб, Сумська обласна клінічна лікарня

Мозковий інсульт – це найбільш поширене і небезпечне за своїм перебігом та виходом судинна патологія головного мозку. Показники поширеності, захворюваності і рівень смертності від інсульту в Україні неухильно зростає. Найвищі показники поширеності цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) у 1998 році зареєстровані у м. Севастополі (12048,4), Луганській (8565,6), Сумській (7650,3) областях (на 100 тисяч населення).

Найвищі показники смертності від ЦВЗ зареєстровані у Сумській області – 535,2 на 100 тисяч населення. У структурі судинних захворювань головного мозку провідне місце посідають гострі порушення мозкового кровообігу. Переважна більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, стають інвалідами. Слід відзначити, що третина інсультів спостерігається у осіб працездатного віку.

У напомену дослідженні вивчались показники поширеності, захворюваності та смертності при ЦВЗ у Сумській області, всіх районах за 1996-1999 р.

У 1996 р. поширеність ЦВЗ складала в області 6590,00 на 100 тисяч населення. Найвищі показники зареєстровані у Сумському (9449,30) та Роменському (9424,50) районах. У 1997 р. виявлено така сама тенденція – збільшення поширеності ЦВЗ у Сумському та Роменському районах (відповідно 8605,17 і 9757,69 на 100 тисяч населення при 6664,07 – по області).

У 1998 р. зареєстровано зниження поширеності ЦВЗ. Найвищі показники у Краснопільському (7080,02), С-Будському (6103,99), Сумському (6059,55) районах при 4710,78 на 100 тисяч населення в області.

Захворюваність ЦВЗ в області неухильно зростала від 707,00 до 730,95 на 100 тисяч населення, а найвища була у 1996 р. в Охтирському (1215,40), у 1997 р. – у В. Писарівському (2355,94), у 1998 р. – у Конотопському (1658,19) районах на 100 тисяч населення.

За цей період поширеність ЦВЗ з артеріальною гіпертонією зросла з 3784,60 у 1996 р. до 4515,54 на 100 тисяч населення у 1998 р. Зросла і захворюваність з 344,50 до 652,73 на 100 тисяч населення. Найвищі показники зареєстровані у В. Писарівському (1454,39), Роменському (1524,00) районах області відповідно на 100 тисяч населення. Поширеність мозкових інсультів та смертність в області на рівні показників в Україні.

Таким чином, у Сумській області спостерігається неухильне зростання поширеності, захворюваності ЦВЗ найбільш тяжкої її форми – мозкових інсультів, а також збільшення смертності, пов'язаної з ними.

Епідеміологічні дослідження серед населення обумовлюють регіональні особливості формування церебральної судинної патології.