

гестозы выявлены у 45 беременных, угроза прерывания беременности отмечена у 21 беременной, анемия – у 60, внутриутробное инфицирование плода – у 10, пиелозктазии почек плода - 2, а у 21 беременной отмечалась ретардация плода.. Роды обследуемых осложнились гипоксией внутриутробного плода, ранним отхождением околоплодных вод, слабостью родовой деятельности и гнойно-септическим течением послеродового периода у 12 % женщин. При рождении у 21 ребенка отмечена низкая масса тела и у 2 – низкая оценка состояния по шкале Апгар.

Таким образом, анализ течения беременности и родов у женщин, страдающих пиелонефритом, дает основание для выделения их в группу высокого риска и пристальной тройной диспансеризации и внимания к ним акушеров-гинекологов, терапевтов и урологов.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ ПРИ ГЕСТОЗАХ

Слишко Л.О., Чумаченко О.Ю. (студ. 6 курса)

Начный руководитель – доц. Вержанский П.С.

Кафедра акушерства и гинекологии

Проведен анализ 10 историй родов с перинатальными потерями при поздних гестозах различной степени тяжести. Из них с нефропатией 1 степени было три случая.

Установлено, что наиболее частым осложнением являлась задержка внутриутробного развития плода, при которой плод был не в состоянии перенести 400 схваток и погибал уже в середине первого периода родов. У трети из обследуемых из-за тяжелого течения позднего гестоза и со стороны показаний матери произведено досрочное родоразрешение, однако дети погибли из-за дистресс-синдрома. Из-за преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты погибло два плода и один - при

эклампсии внутриутробно несмотря на абдоминальное родоразрешение.

Таким образом, поздние гестозы являются причиной перинатальных потерь.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бельмас Э.В., Ройко Е.А. (студ. 6 курса)
Научный руководитель – доц. Сухарев А.Б.
Кафедра акушерства и гинекология

Рак шейки матки занимает 4 место после рака желудка, органов дыхания и кости.

Нами проведен анализ заболеваемости раком шейки матки в г. Сумы и районах области в течение 15 лет. Прослежена связь между заболеваемостью и организацией профилактических осмотров населения процентом взятых мазков на цитологическое исследование.

Установлено, что в районах области, где осмотр женщин проводится в 2 этапа, частота заболеваемости раком шейки матки ранних стадий практически не изменялась и соответствовала средним республиканским показателям, а запущенные клинические формы – встречались среди не организованного женского населения при низкой онкологической осведомленности.

Таким образом, четкая организация медицинских осмотров является действенной профилактикой рака шейки матки. Однако, онкологическую осведомленность населения необходимо усилить разными методами и средствами санитарно-просветительной информации.