

эклампсии внутриутробно несмотря на абдоминальное родоразрешение.

Таким образом, поздние гестозы являются причиной перинатальных потерь.

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Бельмас Э.В., Ройко Е.А. (студ. 6 курса)
Научный руководитель – доц. Сухарев А.Б.
Кафедра акушерства и гинекология

Рак шейки матки занимает 4 место после рака желудка, органов дыхания и кости.

Нами проведен анализ заболеваемости раком шейки матки в г. Сумы и районах области в течение 15 лет. Прослежена связь между заболеваемостью и организацией профилактических осмотров населения процентом взятых мазков на цитологическое исследование.

Установлено, что в районах области, где осмотр женщин проводится в 2 этапа, частота заболеваемости раком шейки матки ранних стадий практически не изменялась и соответствовала средним республиканским показателям, а запущенные клинические формы – встречались среди не организованного женского населения при низкой онкологической осведомленности.

Таким образом, четкая организация медицинских осмотров является действенной профилактикой рака шейки матки. Однако, онкологическую осведомленность населения необходимо усилить разными методами и средствами санитарно-просветительной информации.