

## ХАРАКТЕРИСТИКА ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

С.Ф. Колонтаєвська - студ. З курсу

Наукові керівники: проф. А.М. Романюк-кафедра патологічної  
анатомії, зав. відділенням загальної патології Сумського ОПАБ  
Л.І. Карпенко.

В наш час, незважаючи на скорочення виробництва, серед працюючих великий відсоток складають жінки. Часто, як відповідь, на дію шкідливих факторів виникає порушення менструальної функції, частота його становить - 4-48% (Біляєв С.Г., 1999). Нозологічними формами нашого вивчення стали дисфункціональні маткові кровотечі (ДМК), фіброміома матки з геморагічним синдромом (ФЗГ), фіброміома матки без геморагічного синдрому (ФБГ) у жінок репродуктивного віку за п'ять останніх років, працюючих на промислових підприємствах.

Найбільша гінекологічна захворюваність відмічається у Шосткинському, Глухівському, Ямпільському та Кролевецькому районах області. Було виявлено зростання кількості захворівших жінок у віці старше 30 років по всіх нозологіях. Жінки, працюючі на промислових підприємствах, хворі на ФБГ та з ДМК складають близько 26%, а на ФЗГ - 41%. Найбільший відсоток серед працюючих хворих жінок відмічається у Шосткинському районі, а серед непрацюючих на промислових підприємствах - у Глухівському районі. Вивчення патоморфологічних змін в ендометрії при ДМК, ФБГ, ФЗГ показали, що в структурі змін більше 50% займає залозиста гіперплазія ендометрія, третину становили зміни, які відповідали фазі циклу, інші зміни становили 10-15% (до яких відносились фіброматоз, поліпи,adenomatоз, запальні процеси). Таким чином, отримані дані підкреслюють важливість проведення лікувально-профілактичних заходів у жінок після 30 років, які перебувають в умовах несприятливих впливів промислових чинників.