

ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ТРОМБОЕМБОЛІЯМИ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНИХ СУДИН

В.В. Лях (студ. 5 курсу)

Науковий керівник - проф. Кононенко М.Г.
Кафедра хірургічних хвороб

Вивчено результати лікування 184 пацієнтів віком 27 - 95 років з тромбоемболією мезентеріальних судин за 1989 - 1999 р.р. в двох абдомінальних хірургічних відділеннях міської клінічної лікарні №5. Не оперовано 34 хворих із-за тяжкого стану, операцій 150 (81,5 %). Обсяг втручання залежав від розширеності гангрени кишki. Ураження кишечника в басейні верхньобрижової артерії спостерігали у 98,1% хворих. Діагностична лапаротомія виконана у 68 (45,3 %), резекція кишki - у 82 (54,6 %): сегментарна - у 35 (23,3%), розширенна - у 8 (5,3%), субтотальна - у 7 (4,7%); резекція тонкої кишki з правосторонньою геміколектомією - у 19 (12,8%); правостороння геміколектомія - у 8 (5,3%), лівостороння - у 4 (2,6%), резекція сігмовидної кишki - у 1 (0,6%).

Померло 153 (83,2 %) хворих, виписано 31 (16,8%) хворого після резекції кишечника. Таке втручання не протипоказано навіть при субтотальній гангрені тонкої кишki, бо в цьому єдиний шанс спасти пацієнта.

За даними літератури післяопераційна летальність сягає 80% і навіть 100%.