

ГЕПАТОЕЮНОСТОМІЯ - МЕТОД ВІДВЕДЕННЯ ЖОВЧІ ПРИ ОБТУРАЦІ ГЕПАТОХОЛЕДОХА

Р.І. Гребеник (студ. 5 курсу)

Науковий керівник - доц. Бугайов В.І.

Кафедра хірургічних хвороб

Гепатоеюностомія - це методика вимушеного відведення жовчі в кишечник, оскільки із-за обтурації гепатохоледоха інші більш прості втручання технічно виконати неможливо.

За період з лютого 1999 р. по березень 2000 р. в абдомінальних відділеннях міської клінічної лікарні №5 гепатоеюностомії виконано у 7 хворих в віці від 51 до 76 років.

Основні скарги хворих: біль в епігастральній зоні та жовтуха. Білірубінемія була від 128,5 до 772,5 ммоль/л. Після підготовки на протязі декількох днів хворих оперували. У всіх пацієнтів пухлина (рак підшлункової залози - у 3, рак жовчного міхура - у 2, рак шлунку - у 1) та хронічний запальний процес (у 1), розпоширювались на ворота печінки. Після біопсії мобілізували ліву долю печінки і проводили її крайову резекцію на протязі 8-10 см і глибиною до 4 см. Гемостаз обшиванням судин. Через вікно в mesocolon проводили тонку кишку на довгій петлі і накладали двома рядами швів гепатоеюноанастомоз та міжкишечний по Брауну з заглушкою на привідну петлю між ними. У 6 хворих жовтуха клінічно і лабораторно різко зменшилась і вони виписані. Одна хвора померла від розпаду пухлини шлунку та інтоксикації.

Таким чином, гепатоеюностомія - методика вибору в "безвихідних" ситуаціях біліарного блоку.