

ЖОВТЯНИЦЯ ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ

Б.О.Пазинюк (студ. 6 курсу)

Науковий керівник - проф. Кононенко М.Г.

Кафедра хірургічних хвороб

Проаналізовано історії хвороби 33 хворих на жовтяницю пухлинної природи 5-ї міської клінічної лікарні за 1996-1998 р.р. Чоловіків було 20, жінок - 13 в віці від 33 до 91 року (з них старше 70 років - 8). Скарги: біль (28), жовтушне забарвлення шкіри (17), тошнота, рвота (16), загальне нездужання (13). Тривалість захворювання склала: декілька годин - у 5, до 7 днів - у 16, до 3 тижнів - у 6, до 3 міс. - у 5, до 5 міс. - у 1. Хворі госпіталізовані найчастіше з механічною жовтяницею (18) та пухлиною головки підшлункової залози (6). Клінічно жовтушність визначалась у всіх пацієнтів, локальна болючість при пальпації - у 26, пухлина - у 10, збільшений жовчний міхур (симптом Курвуазье) - у 6, збільшена печінка - у 15.

За даними УЗД блокада біліарної системи була виявлена у 21 хворого.

Лабораторно рівень білірубіну сягав від 35,0 до 650 ммоль/л.

Оперовано 19 чоловік. Білідигестивні анастомози виконані у 17 (холецистоєюноанастомози - у 15, холедоходуоденоанастомози - у 2), гастроєюноанастомози із-за дуоденальної непрохідності - у 2.

Пухлина головки підшлункової залози з механічною жовтяницею ст. III гр. II діагностована - у 23, ст. IV гр. II - у 8., пухлина фатерова соска - ст. III гр. II у 2. Із-за пізнього звернення або тяжкого загального стану хворих радикальні втручання не проводилися.