

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ЯЄЧНИКІВ

Шкурко О.С. (студ. 5 курсу).

Науковий керівник – В.В.Андрющенко

Кафедра хірургічних хвороб, обласний клінічний онкодиспансер.

В структурі захворюваності жіночого населення зложісними пухлинами геніталій Сумської області рак яєчників знаходиться на четвертому місці і становить 6,5 на 100 тис. населення. У 1999 р. I – II стадія захворювання виявлені у 26,6% хворих, ІҮ стадія – у 12,7%. При перших стадіях процесу клінічно немає ознак, за якими можна було б визначити характер пухлини яєчника. Пухлини перших стадій захворювання були виявлені під час хірургічних втручань з приводу кістом яєчників. Об'єм операції передбачає ампутацію або екстирпацію матки та видалення великого сальника. За 1997-1998 р.р. в обласному онкодиспансері було виявлено 337 хворих на рак яєчників. Спеціальне лікування проведено 80,1% хворим. Хірургічне лікування проведено у 4,0%, комбіноване – у 54,0%, хіміотерапевтичне - у 41,4% хворих. Екстирпація матки виконана у 22 (14,0%) хворих, ампутація – у 78 (49,6%). Придатки були видалені у 52 (33,1%) жінок, лапаротомія виконана у 5 (3,2%) із ІҮ стадією процесу. Рак яєчників належить до групи пухлин, при яких медикаментозна терапія сприяє ремісії та продовженню життя пацієнток. Тому у післяопераційному періоді усім їм була проведена хіміотерапія. Результати лікування залежать від стадії поширення раку яєчника та від його гістологічної структури. Загальне п'ятирічне видужання хворих становить 30%.