

РЕІНФУЗІЯ КРОВІ ПРИ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНИХ КРОВОТЕЧАХ

Соболев О.Ю. (студ. 2 курсу)

Науковий керівник - доц. Шевченко В.П.

Кафедра хірургічних хвороб, курс загальної хірургії

Реінфузія власної крові постраждалих при внутрішньочеревних кровотечах знаходить широке використання в ургентній хірургії у зв'язку з відсутністю негативних наслідків, притаманних трансплантації донорської крові.

Кров, яка використовується при реінфузії, завжди сумісна, нормотермічна, може бути швидко інфузована без втрати часу на пошук донорської крові і проведення проб на сумісність. Вивчена ефективність реінфузії крові при пошкодженнях паренхіматозних органів з тяжкою внутрішньочеревною кровотечею у 28 пацієнтів, які лікувались в хірургічному відділенні СОКЛ в 1995-1999 р.р. Чоловіків було 20, жінок - 8 віком від 20 до 60 років. Пошкодження селезінки діагностовано у 6, печінки - у 9, розриви сальника, позачеревинні гематоми - у 13. Для виключення прихованого гемолізу проводили пробу Гемпеля. Реінфузія по загальноприйнятій методиці проведена у 6 хворих в обсязі 500 мл - 1200 мл при крововтраті 900 - 2500 мл. Реінфузія була ефективна у 4 (66,6%) хворих. 2 пацієнтів померли від тяжкої поєднаної травми черепа, грудної клітки, живота з пошкодженням печінки.

Таким чином, реінфузія є фізіологічним, ефективним і фізіологічним методом лікування при внутрішньочеревних кровотечах.