

Бронхообструктивний синдром інфекційного генезу у дітей раннього віку

Бронхообструктивний синдром- симптомокомплекс, котрий пов'язаний з порушенням бронхіальної прохідності органічного чи функціонально характеру.

Бронхообструктивний синдром у дітей зустрічається досить часто і деколи перебігає важко, супроводжуючись ознаками дихальної недостатності. Маніфестуючи ,як правило, на фоні ГРВІ, він може бути проявом багатьох патологічних станів, найпоширенішим з яких є гострий бронхіт і бронхіальна астма. Частота бронхіальної обструкції, що розвивається на фоні інфекційного захворювання нижніх дихальних шляхів складає від 5 до 40%. Бронхообструктивний синдром у дітей з ГРВІ перебігає ,як правило, у вигляді гострого обструктивного бронхіту і в грудному віці-гострого бронхіоліту.

Клінічні прояви можуть бути різноманітні і варіюють від помірних ознак бронхообструкції до досить вираженої дихальної недостатності. ГРВІ у дітей завжди перебігають з реакцією запалення, яка розвивається у відповідь на потрапляння в організм вірусного чи бактеріального агента. Запалення- корисна фізіологічна реакція, однак досить часто вона приймає патологічний характер і сприяє тяжкому перебігу респіраторної інфекції і формуванню бронхообструктивного синдрому. Своєчасне і раціональне призначення патогенетичної терапії дітям з ГРВІ, в тому числі з гострим обструктивним бронхітом, забезпечить адекватний контроль над клінічними проявами респіраторної інфекції і сприятиме зменшенню розвитків ускладнень захворювання.

Мозгова, Ю.А. Предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт / Ю.А. Мозгова, О.І. Сміян // Матеріали XI наукової конференції студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки», 13-15 квітня. - ч. II.- Дніпропетровськ, 2011. – с. 37-38