

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ

врач педиатр Циганок В.В.

Сумокая обл. детская клиническая больница

Атопический дерматит является одним из наиболее тяжелых и часто встречаемых дерматозов, начинающихся в раннем детском возрасте и характеризующихся хроническим течением со сменой проявления заболевания на коже (экзема, нейродермит, атопический дерматит и т.п.).

Под наблюдением находилось 170 человек (АтД) в возрасте от 3 до 30 лет. Из анамнеза установлено, что у 82 из 170 больных (48,2%) страдают или перенесли ранее разные аллергические заболевания близкие родственники. Среди сопутствующих заболеваний, перенесенных в прошлом, отмечались: заболевания органов пищеварения - у 127 (74,1%), органов дыхания - у 87 (51,2%), лор-органов - у 91 (53,5%). Аллергический ринит отмечался в прошлом у 15 (8,8%) больных АтД. Таким образом, наличие сочетанных кожных и висцеральных повреждений являются причинами тяжелого течения АтД и диктуют необходимость комплексного подхода к обследованию пациентов, их лечению и профилактике рецидивов заболевания.

НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВТОРИЧНЫХ ПОСРЕДНИКОВ У БОЛЬНЫХ ДЕТСКОЙ ЭКЗЕМОЙ

главный врач Висягин В.Б.

Донецкая областная дерматологическая больница

Циклические нуклеотиды (цАМФ и цГМФ) относятся к важнейшим универсальным внутриклеточным посред-