



ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ HBs Ag У ДОНОРОВ

Любчак В.А. Каплин Н.Н. Махно Л.А. Любчак В.В.
Сумокая областная станция переливания крови
Кафедра медбиологии и микробиологии СумГУ

Гепатит В является весьма актуальной проблемой современной вирусной инфекционной патологии и гепатологии. Поверхностный антиген выявляли с помощью иммуноферментной тест-системы. Было обследовано 72028 доноров.

Статистика велась по месяцам в течение трех лет: с 1994 по 1996 годы (положительных проб было соответственно: 60, 105, 32). Результаты исследования показали определенную тенденцию в количестве выявлений HBsAg в зависимости от месяца года. При этом наблюдались пики в 3, 6, 12 и спады в 1, 5, 8 месяцах. Наблюдения за динамикой на протяжении трех лет позволяют с высокой достоверностью говорить о спадах и подъемах процента носительства HBs Ag у доноров. Для создания окончательной диаграммы был взят именно процент носительства, так как он дает наиболее полное представление о данном вопросе, а для облегчения восприятия был выбран тип диаграммы, где, начиная снизу, каждый следующий график является суммой предыдущих:



HBsAg

Таким образом можно сделать вывод: количество носителей HBs Ag у обследованных нами доноров зависело на протяжении трех лет от месяца года.