

МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ ШЛУНКА

*Нуну Каландадзе; Коритова К. П., студ. 3-го курсу
Наукові керівники: доц. Г. Ю. Будко, доц. Л. І. Карпенко
СумДУ, кафедра патоморфології*

Методи діагностики доброякісних пухлин шлунку розписані не обширно, оскільки вони складають лише до 12% від всіх пухлин шлунку. Більшість доброякісних пухлин безсимптомний і виявляється при рентгенологічних дослідженнях сдвоєним контрастуванням або при ендоскопічних дослідженнях, що проводяться у зв'язку з іншими захворюваннями. Інколи поліпи є випадковою знахідкою при ревізії шлунку під час хірургічної операції з приводу інших патологічних процесів.

Комплексна діагностика пухлин шлунку включати: загальноклінічні, лабораторні дослідження: езофагогастродуоденофіброскопію з поліфокальною біопсією і подальшим гістологічним дослідженням біоптата; рентгенологічне дослідження шлунку; комп'ютерну томографію. Остаточний діагноз встановлюють після ендоскопічної біопсії і гістологічного дослідження біоптата. Точний діагноз доброякісної пухлини шлунку можна встановити лише після операції при мікроскопічному дослідженні.

За клінічними, рентгенологічними і ендоскопічними даними може бути висловлено лише припущення про доброякісну природу пухлини.