

ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

*Пилипенко В. Г., Кисляков В. П., Маркин М. А., Сохань Л. В., Шпирко Я. Г.
Сумской областной клинической госпиталь для ИОВ*

Трофические язвы у людей пожилого возраста развиваются при: варикозном расширении вен нижних конечностей, хронической венозной недостаточности (ХВН), облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей, при ишемии и диабетической ангиопатии нижних конечностей, язвах Марторелля. У пожилых людей при прогрессировании ХВН отмечается медленное заживление и рецидивирование язв, что вызвано высоким внутривенным гидростатическим давлением, развитием венозного стаза, сопутствующей сердечной недостаточностью.

Результаты. В хирургическом отделении госпиталя за 2005-2010г. пролечено 518 больных с трофическими язвами нижних конечностей. Проведен посев на флору и чувствительность к антибиотикам, гистологические исследования при длительных язвах (более года). 203 пациентам с выраженной ХВН и обширными трофическими язвами проводилось комплексное лечение: флеботоники, иммуностимуляторы, поливитамины, антибактериальные препараты, лимфокомпрессия компрессионным трикотажем, возвышенное положение нижних конечностей. 73 пациентам с наличием малых и средних трофических язв применяли цинк-желатиновые повязки (повязка Уна), с предварительной тщательной санацией пораженных участков кожи в течение 7-10 дней. В результате (через 6 месяцев) у 68 % больных наступило полное заживление язв, а у 32 % – частичное. В 5 случаях появились осложнения, продолжено лечение открытым способом.

Оперативное лечение выполнено у 103 пациентов – это флебэктомия по Бэбкокку, Нарату, Фельдеру, Кокету. В 32 случаях флебэктомия выполнена с одновременной пересадкой кожи. Аутодермопластика проводилась полнослойным перфорированным лоскутом, взятым из паховой складки по разработанной методике – 18 наблюдений, расщепленным лоскутом – 14 наблюдений. В 29 случаях кожные лоскуты прижились полностью в отделении. В 3-х случаях больные выписаны с эпителизирующими язвами. У всех больных через год рецидивов нет, результат у 100% положительный.

Таким образом, у пожилых людей после устранения причины трофических язв при ХВН, язвы заживают. При отсутствии противопоказаний, независимо от возраста, необходимо оперативное лечение.