

КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ

Сміян О. І., Василюшин Х. І.

СумДУ, кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами ПП і ДІ

Патологія бронхолегеневої системи є однією з найпоширеніших у дитячому віці, особливо це стосується пневмоній. У структурі захворюваності провідне місце займають негоспітальні пневмонії (НП). Пневмонія продовжує залишатися найбільш поширеною хворобою людини, яка і в XXI столітті є важливою медико-соціальною проблемою. В останні роки рівень захворюваності гострою пневмонією у дитячому віці не знижується, а навпаки має тенденцію до росту.

Нами було обстежено 69 дітей, хворих на позагоспітальну пневмонію, які перебували на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні №1 Сумської міської дитячої лікарні. В їх числі було 44 (63,8%) хлопчиків і 25 (36,2%) дівчаток. Серед симптомів у хворих дітей частіше зустрічався сухий, малопродуктивний кашель (53,6%), вологий – 40,6%. Нежить, закладеність носових ходів виявлялися у 88,4% дітей. У 33,3% хворих відмічалась дихальна недостатність, яка супроводжувалась периферійним ціанозом. Встановлено, що ускладнена пневмонія діагностувалась у 37,6% дітей, при чому у хворих віком до одного року даний стан виявлявся у 15,9%. Частіше всього зустрічалась правостороння локалізація процесу (82,6%), лівостороння пневмонія виявлялась у 13% випадків. Нижня доля легень вражалась частіше (72,5%), ніж верхня (23,2%) та середня (4,3%).

Аналізуючи дані рентгенологічного обстеження дітей, хворих на позагоспітальні пневмонії, встановлено, що у дітей раннього віку частіше виявлялися вогнищеві ураження легень (58%), вогнищево-зливні 39,1%, сегментарні 2,9%.

Таким чином, провідними симптомами НП у дітей раннього віку є сухий малопродуктивний кашель, дихальна недостатність, нежить. Патологічний процес в легенях частіше виявлявся з правої сторони. По характеру запального процесу у дітей раннього віку переважали вогнищеві ураження легень.