

## ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

*Романюк С. А., студ. 3-го курсу*

*Науковий керівник – д-р мед. наук, проф. О. І. Сміян*

*СумДУ, кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами ПП і ДІ*

**Актуальність проблеми.** Актуальність і соціальна значущість проблеми діагностики та лікування дітей з синдромом вегетативної дистонії (СВД) обумовлена високою поширеністю, особливо серед школярів (40–60%) і високою ймовірністю формування психосоматичної патології, що призводить до ранньої інвалідизації та передчасної летальності

**Мета** – вивчення клініко-анамнестичних даних у дітей з вегетативними дисфункціями (ВД) в залежності від тону вегетативної нервової системи

**Матеріали та методи.** Предмет дослідження – ступінь вегетативних змін, особливості клінічних проявів, психосоматичний статус у 157 дітей з СВД. Методи дослідження – аналіз літературних даних, клінічна характеристика дітей, загальноклінічні та психодіагностичні (тест Спілбергера-Ханіна, опитування для виявлення панічних атак (PHQ) PanicScreeningQuestions, опитувальник Вейна) методи дослідження.

**Отримані результати.** Встановлено, що для дітей з ваготонією характерна значна кількість скарг переважно астеноневротичного характеру. Діти з симпатикотонією відрізнялися меншою кількістю скарг. У дітей з ейтонією клінічна картина проявів ВД має полісиндромальний, поєднаний характер:

**Висновки:** найбільшу поширеність серед дітей із симпатикотонічним та парасимпатикотонічним типами вихідного вегетативного тону мали такі синдроми: нейроциркуляторний, скоротливої дисфункції міокарда, гіперкінетичний, дизадаптації та прояви вегето-вісцеральної дисфункції.