

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРТЕКСИНА

Паскарик Е.Ю., Вощенко М.А.

Научный руководитель – ассист. Редько Е.К.

СумГУ, кафедра педиатрии с курсом медицинской генетики

**Сумская областная детская клиническая больница*

Цель: оценка эффективности кортексина у больных с эпилептическими синдромами различной этиологии в условиях отделения детской неврологии.

Материалы и методы: группа наблюдения включала 46 детей от 1 месяца до 15 лет с эпилептическими синдромами различной этиологии. В лечении этих больных наряду с комплексной общеклинической терапией назначался препарат кортексин 0,5 мг на кг массы тела до 2 лет, старше 2 лет по 10 мг в сутки, внутримышечно ежедневно, курсом 10 дней.

Результаты: отмечалось улучшение неврологической симптоматики в виде отсутствия рецидивов эпилептических приступов, стабилизировалась гемодинамика, улучшилось самочувствие больных, больные стали более активны, восстановилось раннее энтеральное питание, уменьшились сроки пребывания больных в реанимационном отделении.

Выводы: полученные результаты позволили включить препарат кортексин в стандарт рациональной терапии лечения больных с эпилептическими синдромами различной этиологии.