

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

**Нагорний О.В., Нагорна К.О., студ.
Науковий керівник – к.м.н., доц. Будко Г.Ю.
СумДУ, кафедра патологічної анатомії
КЗ СОКЛ

Актуальність. Дегенеративно-дистрофічні захворювання в сучасних умовах істотно помолодшали. Значну кількість інвалідів внаслідок цих захворювань складають переважно особи працездатного віку (30-45 років).

Мета дослідження. Вивчити частоту дегенеративних процесів у суглобах пацієнтів різної статі та віку.

Завдання дослідження. Провести літературний огляд етіопатогенетичних особливостей дегенеративних захворювань суглобів. Проаналізувати клінічні та рентгенологічні дані історій хвороб пацієнтів та охарактеризувати особливості дегенеративно-дистрофічного ураження суглобів.

Матеріали та методи дослідження. Основу роботи склав аналіз результатів лікування 390 хворих на захворювання диспластичного генезу, що лікувались у відділенні ортопедії та травматології м. Сум в період з 2009 по 2012 роки. У роботі використані клінічні та рентгенологічні дані, статистичні методи досліджень.

Результати дослідження. Кількість пацієнтів на коксартроз у 2009 р. - 195 пацієнтів, у 2010 р. - 186 пацієнтів, у 2011 р. - 245 пацієнтів, у 2012р. - 164 пацієнта, що становить 32,2% від усіх захворювань суглобів. Вікова межа становила від 27 до 65 років як для жінок, так і для чоловіків. Кількість пацієнтів на гонартроз у 2009 р. – 90 хворих, у 2010 р. – 110 хворих, у 2011 р. – 107 хворих, у 2012р. – 83 хворих, що складає 37% від загальної кількості прооперованих хворих. Вікова межа становила від 40 до 79 років, з переважанням жіночої статі. Кількість пацієнтів на остеоартроз міжфалангових суглобів кисті, у 2009 р. – 15 хворих, у 2010 р. – 12 хворих, у 2011 р. – 13 хворих, у 2012р. – 11 хворих. З приводу даного захворювання оперативні втручання не проводилися. Вікова межа становила від 45 до 79 років, з переважанням жіночої статі. Оперативні втручання з приводу поперечної плоскостопості склали: у 2009 р. – 6 хворих, у 2010 р. - 13 хворих, 2011р. - 8 хворих, 2012р. – 6 хворих. 95% оперованих становлять жінки. Вікова межа становила від 27 до 65 років

Висновки. На підставі вище написаного серед дегенеративних захворювань суглобів перше місце займає – остеоартроз кульшових суглобів. Хворіють переважно люди працездатного віку (від 19 до 60 років), що призводить до стійкої втрати працездатності (інвалідизації). Серед пацієнтів з даною патологією 49,5 % становлять жінки у віці від 19 до 79 років. Інволютивні зміни в суглобах людини настають поступово і залежать від багатьох факторів в тому числі від спадковості, статі, харчування, способу життя, спеціальності, побутових умов.