

ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Сумцов Г.А., *Коваленко Н.А., *Яценко Т.В.

СумГУ, кафедра семейной медицины

*КУ Сумской городской клинической родильный дом №1

С целью повышения эффективности онкопрофилактических мероприятий по выявлению фоновых, предраковых заболеваний и раннего рака шейки матки в женской консультации КУ Сумского городского клинического родильного дома №1 создан кабинет патологии шейки матки.

Задачи. Изучить эффективность работы кабинета патологии шейки матки.

Материал и методы исследования. За последние 3 года в кабинете обследована кольпоскопически 8521 женщина, из них в порядке контроля после лечения 2142 больные. Кольпоскопия является одним из самых информативных, безопасных, доступных и рентабельных методов обследования женщин с патологией шейки матки. В кабинете применялся комплексный метод обследования: кольпоскопия, цитологические мазки и соскобы из шейки матки и цервикального канала, мазки-отпечатки. В случаях подозрения на тяжелую дисплазию или малигнизацию для проведения прицельной биопсии больных направляли в кабинет патологии шейки матки областного онкологического диспансера.

Результаты. После проведенного обследования у 5184 женщин выявлены заболевания. Из них основные: эрозии шейки матки у 2204 (42,5%) больных, эктропионы шейки матки у 735 (14,2%), дисплазии эпителия шейки матки у 242 (4,7%), полипы цервикального канала у 191 (3,7%), эндометриоз шейки матки у 105 (2,0%), децидуоз шейки матки у 74 (1,4%), лейкоплакии шейки матки у 32 (0,62%) и рак шейки матки у 35 (0,7%) больных. Следует остановиться на основных кольпоскопических картинах дисплазий. Это у 106 (43,8%) больных наблюдался ацетобелый эпителий с изменениями типа пунктуаций, у 41 (16,9%) – мозаики, у 5 (2,0%) – грубой мозаики, у 68 (28,1%) – сочетание пунктуации и мозаики, у 13 (5,4%) – сочетание пунктуации и лейкоплакии и у 9 (3,7%) больных – сочетание мозаики и лейкоплакии. В случаях начальных форм рака шейки матки самым частым кольпоскопическим признаком была сосудистая атипия.

Цитологически у 316 больных (в основном в группе с установленной кольпоскопически патологией) выявлены различной степени выраженности эпителиальные дисплазии. Среди них группа ША у 210 больных, ШБ – у 68, подозрение на рак у 24 и рак – у 14 больных. Случаев запущенного рака шейки матки в течение 3-х лет не было.

Выводы. Все выявленные больные оздоравливались. Из них: консервативно – 771 (14,8%) больная, путем химической коагуляции эрозий – 185 (3,5%), диатермокоагуляции – 302 (5,8%), конусовидная диатермоэксцизия шейки матки произведена у 601 (11,6%) и полипэктомия у 349 (6,7%) больных. По итогам работы кабинета за 3 года снято с диспансерного учета по выздоровлению 1798 женщин.