

ОЦІНКА СТАНУ ПАРОДОНТУ У ПАЦІЄНТІВ З РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ НА ТЛІ ЛІКУВАННЯ БІСФОСФОНАТАМИ

Білозецький І. І.

*Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського,
кафедра хірургічної стоматології*

Ревматоїд-індукований остеопороз як наслідок хронічного запального процесу призводить до втрати кісткової маси шляхом стимуляції остеокластів і підвищенні резорбції кістки. На сьогоднішній день відомо, що й ревматоїдний артрит (РА) і остеопороз супроводжуються змінами пародонта. З метою лікування остеодифіцитних станів в ревматології використовують бісфосфонати, які інгібують резорбцію кістки і збільшують її масу.

Мета. Метою дослідження було оцінити ефект бісфосфонатів на перебіг хронічного пародонтиту у хворих на РА.

Методи. Обстежено 26 пацієнтів з РА, серед яких остеопороз був діагностований у 46 %, половина з яких використовували бісфосфонати щотижнево в поєднанні з препаратами кальцію і вітаміну Д3. Стан пародонтиту оцінювали за показниками Індекс Green, Vermillion, РМА, Пародонтальний індекс, СРІТН, Індекс Фукса, МСІ, МІ, РМІ.

Результати. Пацієнти, що отримували бісфосфонати для лікування остеопорозу демонстрували достовірно кращі показники стану, що проявлялося вищими показниками індексу Фукса, МСІ, МІ, РМІ.

Висновок. Ці дані дозволяють припустити, що бісфосфонати покращують клінічний перебіг пародонтиту у хворих на РА.