

СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНOSTІ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ М. СУМИ ТА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кобильченко М. О., Токар В. С.

Науковий керівник – асистент Васильєва О. Г.

Сумський державний університет, кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами ПП і ДП

Серед провідних педіатричних дисциплін, які висвітлюють аспекти дитячої патології, значне місце посідає гастроентерологія.

Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту займають вагоме місце в структурі дитячої соматичної патології, поступаючи лише захворюванням дихальної системи. Це хвороби, які можуть призвести до інвалідизації та втрати працездатності дорослих, а витоки їх лежать саме в дитинстві.

Метою наших досліджень було вивчення структури захворюваності шлунково-кишкового тракту у дітей м. Суми та області за період з 2008 року по 2013 рік.

Проведений аналіз статистичних даних щодо поширеності та захворюваності органів травлення у дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні у педіатричному відділенні СМДКЛ Св. Зінаїди та гастроентерологічному відділенні СОДКЛ за період з 2008 по 2013 роки.

Кількість випадків хвороб органів травлення в Сумській області та м. Суми в 2008 р. склала 22937, в 2009 р. – зменшилась до 21401, в 2010 р. – 21227, в 2011 р. – 20362; в 2012 р. – 20161 і в 2013 р. вона склала 20409 випадків.

У структурі захворювань органів травлення переважають хронічні гастрити та хронічні гастродуоденіти – 80 % хворих, але кількість їх порівняно з 2008–2011 роками значно знизилась (з 8469 випадків у 2008 р. до 6688 – у 2013 р.).

Друге місце посідають функціональні розлади шлунка і дванадцятипалої кишки, кількість яких навпаки зросла за рахунок ретельної диференційної діагностики з хронічними гастритами та гастродуоденітами з 647 випадків у 2008 р. до 945 – у 2013 р.

Третю позицію займають виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – 152 випадки та холецистити й холангіти – 162 випадки за 2013 р.

З 2013 року до переліку патологій шлунково-кишкового тракту додали синдром подразненого кишечника, поширеність якого в Сумській області склала 31 випадок, що складає 0,17 на 1000, целіакію – 8 випадків (0,04:1000) та неспецифічний виразковий коліт – 4 випадки (0,02:1000).

Звертає на себе увагу зростання частоти гастро-езофагального рефлюксу у дітей, захворюваність якого в 2013 році складала 0,09 %.

Показник захворюваності патологій підшлункової залози залишається сталим протягом останнього п'ятиріччя і складає 0,04 ‰ в 2008–2012 роках, та 0,03 ‰ – у 2013 році.

Враховуючі вищезазначене, можна сказати, що рівень захворюваності та поширеності захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей м. Суми та області знаходиться на більш-менш сталому рівні. Основне місце займають органічні ураження шлунково-кишкового тракту, які потребують ретельної діагностики, адекватної протирецидивної терапії та диспансерного спостереження.