

## АНАЛИЗ ПРИЧИН РОЖДЕНИЯ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ ОЦЕНКОЙ ПО ШКАЛЕ АПГАР

*Магинга Барака Муса, Якушенко М. Н.*

*Научный руководитель – доц. Редько Е. К.*

*Сумский государственный университет, кафедра педиатрии с курсом медицинской генетики*

**Цель:** выявить причины рождения доношенных детей с низкой оценкой по шкале Апгар.

**Материалы и методы:** проанализирована 31 история развития доношенных детей, родившихся в перинатальном центре клинического родильного дома г. Сумы.

**Результаты.** При оценке анамнеза выявлено, что 9 матерей были не зарегистрированы в браке, а у 2 женщин имелись профессиональные вредности. У 7 женщин беременность протекала на фоне хронической фетоплацентарной недостаточности. В родах у 13 женщин имелась слабость родовой деятельности, по поводу которой использовалось родоусиление окситоцином. Вакуум экстракция плода применена у 3 женщин, наложение акушерских щипцов – у 2 родильниц. Преждевременное излитие околоплодных вод отмечено у 10 женщин, у 3 – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, у 3 – затруднение при выведении плечиков ребенка. Через естественные родовые пути родилось 20 детей, путем кесарева сечения – 11. Дети родились доношенными с массой тела от 2500 до 4900 г, ростом от 45 до 57 см, на первой минуте жизни имели оценку по шкале Апгар от 1 до 4 баллов. Через 5 минут после рождения у 19 детей оценка по шкале Апгар составила 7–8 баллов, у 9 детей – 5–6 баллов. Только у 3-х детей к 5 минуте жизни оценка по шкале Апгар сохранялась 3–4 балла. У 12 новорожденных при рождении имелась родовая опухоль, у 11 детей – мелкоточечные кровоизлияния в кожу лица и склеры глаз. У 8 детей наблюдался аспирационный синдром. Родились с признаками задержки внутриутробного развития по гипотрофическому типу 5 детей. У 28 новорожденных был поставлен диагноз перинатальное поражение центральной нервной системы. У 23 детей наблюдался синдром двигательных дисфункций, у 3 новорожденных – синдром угнетения, у 2 – судорожный синдром, у 2 – синдром гипервозбудимости и внутричерепной гипертензии. Выписаны домой под наблюдение участкового педиатра и невропатолога 11 детей, остальные были переведены в отделение патологии новорожденных.

**Выводы.** Причинами рождения доношенных новорожденных с низкой оценкой по шкале Апгар явились: хроническая фетоплацентарная недостаточность, преждевременная отслойка плаценты, раннее излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельности.

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорелов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 213.