

## **ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ, ЛІКУВАННЯ**

*Костюченко Є. В.*

*Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, кафедра ендокринології*

**Актуальність.** У останні роки спостерігається тенденція до зростання захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) в Україні. Актуальними залишаються питання дослідження і розробки нових ефективних методів профілактики і лікування цих захворювань. А для оцінки цієї ефективності та контролю в цілому необхідно постійно проводити дослідження сучасного стану захворюваності, смертності, інших статистичних показників щодо всіх видів ЗН. У даній роботі ми провели таке дослідження щодо ЗН щитовидної залози.

**Мета.** Дослідити стан захворюваності та смертності від ЗН щитовидної залози в Україні у період 2005–2012рр., проаналізувати сучасний стан лікування.

**Матеріали та методи.** Аналіз останніх статистичних даних Національного канцер-реєстру України, огляд сучасної літератури щодо даної проблеми.

**Результати.** Спостерігається підвищення ролі ЗН щитовидної залози у структурі на всіх ЗН (за захворюваністю): якщо у 2005р. ЗН щитовидної залози склали 1,45 % всіх ЗН (0,5 % – серед ЗН чоловіків та 2,35 % серед ЗН жінок), то у 2011р. ці показники, відповідно, склали 1,96 %, 0,68 %, 3,12 %. Таким чином, ЗН щитовидної залози зустрічаються частіше у жінок, проте тенденція на збільшення питомої ваги цього захворювання у структурі всіх ЗН спостерігається і у чоловіків, і у жінок.

Захворюваність на ЗН щитовидної залози у 2011р. складала 7,3 на 100 тис. нас. (zareєстровано 3320 випадків). Захворюваність жінок складала 11,3 на 100 тис. нас. (2773 випадки), чоловіків – 2,6 на 100 тис. нас. (547 випадків). У 2005р. захворюваність складала 5,0 на 100 тис. нас. (7,8 – для жінок та 1,9 – для чоловіків). Отже, спостерігається значна тенденція на збільшення захворюваності населення на ЗН щитовидної залози.

Смертність від ЗН щитовидної залози є порівняно невисокою. У 2011р. zareєстровано 367 смертей: 119 – чоловіків, 248 – жінок. У перерахунку на 100 тис. населення це, відповідно, складає 0,8 випадків смерті: 0,6 – чоловіків і 1,0 – жінок. Для порівняння, у 2005р. смертність складала 398 випадків (0,9 на 100 тис. нас.). Отже, вираженою є тенденція на зниження смертності від ЗН щитовидної залози.

У віково-статевій структурі захворюваності на ЗН велика роль належить ЗН щитовидної залози у жінок у віці 15–29р.: у 2005р. ці ЗН були на 3-му місці за частотою виникнення (11,1 %). У 2011р. у жінок у віці 18–29р. ЗН щитовидної залози були на 2-му місці за частотою виникнення (15,5 %), а також у віці 30–54р. на 5-му (6,1%).

У віково-статевій структурі смертності від ЗН щитовидної залози не увійшли до 5-ки за питомою вагою до жодної з категорій. Це підтверджує вище сказане, що смертність від ЗН щитовидної залози є порівняно невисокою.

У 2011р. спеціальним лікуванням охоплено 92,4 % хворих. З них тільки хірургічне лікування отримали 33,6 %, комплексне або комбіноване – 60,9 %. У 2005р. – відповідно 89,0 %; 52,9 %; 41,4 %. Отже, лікувальна тактика значно змінилася за період з 2005 по 2011рр.: у лікуванні таких хворих більшу роль стали відігравати комбінований та комплексний методи, та значно знизилася роль тільки хірургічного методу.

**Висновки.** Нами встановлено, що впродовж періоду 2005–2012рр. в Україні встановилася тенденція на підвищення захворюваності на ЗН щитовидної залози, проте зниження смертності; збільшення питомої ваги ЗН щитовидної залози у віково-статевій структурі захворюваності у віці 15–29 р., а також 30–54 р.; значне збільшення застосування комплексного або комбінованого лікування та зменшення тільки хірургічного.

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорелов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 255-256.