

## **КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ДІАРЕЙНОГО СИНДРОМУ ПІСЛЯ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ**

*Кравець О. В., Кобилицький С. М., Мисловський І. А.  
КЗ Сумська обласна клінічна лікарня*

Нами проаналізовано результати холецистектомії (Х) у 235 хворих. У післяопераційний період у 7 (2,9 %) хворих спостерігали діарейний синдром з частотою стільця від 3 до 6 разів на добу. Характерними ознаками були випорожнення яскраво-жовтого або зеленуватого забарвлення та біль при пальпації у правій здухвинній ділянці. При колоноскопії спостерігали присутність жовчі, яка покривала стінки сліпої та висхідного відділу ободової кишки. Лабораторно - висока концентрація жовчних кислот у калі.

Лікування включало: дієту № 5; ентеросорбенти (смекта, ентеросгель); антибактеріальні препарати (в основному фторхінолони); пробіотики (лінекс, біфіформ, біфідумбактерин); антациди (маалокс, фосфалюгель, смекта); ферментні препарати (мезим, панкреатин, креон); спазмолітики (но-шпа, спазмомен).

Застосування комплексної терапії сприяло припиненню діареї і нормалізації випорожнень протягом 2–3 тижнів. Таким чином, адекватна терапія дозволяє істотно поліпшити якість життя хворих після оперативного втручання.

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорелов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 256-257.