

## РАДИКАЛЬНАЯ ЦИСТЭКТОМИЯ: ПОКАЗАНИЯ, БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

*Васильева В. Д., Мыцык Ю. И.*

*Научный руководитель – проф. Шамраев С. Н.*

*ДонНМУ им. М. Горького, кафедра урологии*

**Цель исследования** – анализ результатов открытой радикальной цистэктомии (ОРЦЭ). **Материал и методы.** Изучены истории болезни 31 пациента (1998–2013гг.), перенесших ОРЦЭ по поводу рака мочевого пузыря (РМП). Определяли результаты и смертность, а также выживаемость. **Результаты.** Основными показаниями к проведению цистэктомии были: а) мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря T<sub>2-4</sub> N<sub>0</sub>M<sub>0</sub> – 26 (83,87 %), б) мышечно-неинвазивный рак T1G3 – 1 (3,23 %), экстрофия мочевого пузыря – 2 (6,45 %). Основными жалобами пациентов были: гематурия – 28 (90,32 %), дизурия – 17 (54,84 %), боль в надлобковой области – 10 (32,26 %). Основными осложнениями были: кровопотеря (> 500 мл) и гемотрансфузии – 90,32 % случаев, обострение хронического пиелонефрита – 10 (34,5 %), повторные операции – 6 (20,7 %). Ранняя смертность отмечена у двух (6,5 %) пациентов, поздняя – у 4 (12,9 %), отдаленная – у 8 (25,8 %).

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорелов. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 294-295.