

Вплив комбінації препаратів фосфогліву та ентеросорбенту «Біле вугілля» на стан системи інтерферону у хворих на хронічний вірусний гепатит В

Соцька Я. А., Рябенко Н. Б., Рябенко Е. Б., Кривуля І. Г.

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Effect of combinations of fosfohliv and enterosorbent "Bile vugilla" on condition of interferon systems in patients with chronic viral hepatitis B

Sotska Y. A., Ryabenko N.B., Ryabenko E. B., Krivulya I. G.

SE "Lugansk State Medical University"

E-mail: sotckaya@mail.ru; Sotska J. A.

Актуальною проблемою сучасної інфектології є хронічний вірусний гепатит В. Це пов'язано з ростом захворюваності, частими ускладненнями та частим розвитком небажаних побічних ефектів стандартної інтерферонотерапії.

Нашу увагу привернула можливість застосування гепатопротекторів та ентеросорбентів з метою медичної реабілітації хворих хронічною патологією внутрішніх органів, у тому числі хронічним вірусним гепатитом В.

Метою роботи було вивчення впливу комбінації препаратів фосфогліву та ентеросорбенту «Біле вугілля» на стан системи інтерферону у хворих на ХВГВ.

Матеріали і методи: Під наглядом знаходилось 67 хворих на ХВГВ. Усі обстежені хворі були поділені на дві групи: основну - 35 пацієнтів та групу зіставлення - 32. Усім обстеженим хворим призначалося загальноприйняте лікування. Крім того, хворі основної групи отримували додатково фосфоглів по 2 капсули 3 рази на день усередину протягом 30-35 діб поспіль та ентеросорбент «Біле вугілля» по 3-4 таблетці 3 рази на добу усередину протягом 15-20 діб, група зіставлення – отримувала тільки загальноприйняті препарати. У всіх хворих вивчали показники інтерферонового статусу. Так, рівень СІФ у хворих основної групи та групи зіставлення в середньому був нижче норми в 1,7 рази.

Результати. При дослідженні рівня СІФ після завершення лікування встановлено, що в основній групі даний показник складав $2,78 \pm 0,09$ МО/мл, а в групі зіставлення рівень СІФ залишався в 1,2 рази нижче норми і складав $2,37 \pm 0,07$ МО/мл, концентрація α -ІФН ($318,3 \pm 3,5$) та γ -ІФН ($47,6 \pm 1,7$) практично відповідала нижній границі норми в основній групі, в групі зіставлення – в 1,3 рази нижче норми.

Висновки: отримані дані свідчать, що лікування хворих на ХВГВ з використанням комбінації фосфогліву та ентеросорбенту «Біле вугілля» є патогенетично обґрунтованим та доцільним.

Вплив комбінації препаратів фосфогліву та ентеросорбенту "Біле вугілля" на стан системи інтерферону у хворих на хронічний вірусний гепатит В [Текст] / Я.А. Соцька, Н.Б. Рябенко, Е.Б. Рябенко, І.Г. Кривуля // Інфекційні хвороби в практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції і Пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, м. Суми, 4-5 червня 2014 р. / Редкол.: М.Д. Чемич, В.Д. Москалюк, О. І. Сміян, В.О. Терьошин, Н.І. Ільїна, В.В. Захлебаєва, А І. Піддубна. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 95-96.