

Голяр Оксана Іванівна, Сішчук Іванна Василівна
**ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології,
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет», м. Чернівці, Україна

Holyar Oksana Ivanivna, Sishchuk Ivanna Vasylivna
**EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF HIV INFECTION IN
CHERNIVTSI REGION**

*Department of Infectious Diseases and Epidemiology,
Higher state educational establishment of Ukraine "Bukovinian State
Medical University", Chernivtsi, Ukraine
E-mail:golyar@mail.ua; Holyar O. I.*

Актуальність. Останнім часом ВІЛ-інфекція поширюється серед населення світу надзвичайно високими темпами. Кордони не є перепонами для «чуми ХХ століття». Україна займає одне з перших місць в Європі за кількістю ВІЛ- інфікованих: майже 90 % з них особи від 15 до 49 років.

Мета роботи. Проаналізувати динаміку поширення ВІЛ-інфекції у Чернівецькій області за 2014 – 2015 рр.

Матеріали та методи. Було проаналізовано дані Інформаційного бюлетня Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України та статистичні дані Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією за 2014-2015 рр.

Результати дослідження. Динаміка реєстрації ВІЛ-інфекції станом на 01.07.15р. по Україні: під наглядом перебувало 124 279 ВІЛ-позитивних громадян України, включаючи 31509 хворих на термінальну стадію ВІЛ-інфекції. Смерть від СНІДу по Україні 36 748, діти народжені ВІЛ-інфікованими матерями 45547.

В результаті дослідження виявлено, що кількість нових випадків захворюваності на ВІЛ у Чернівецькій області станом на 01.07.15 р. (56 осіб, що становить 0,75 % від загальної кількості по Україні (7453)) зменшилася на 7 випадків у порівнянні з відповідним періодом 2014 р. (63 особи – 0,6 % (10387)). Захворюваність на термінальну стадію ВІЛ-інфекції зросла на 17 випадків за відповідні періоди часу: станом на 01.07.15 – 31 випадок (0,77 % від загальної кількості по Україні (3992)) та станом на 01.07.14 – 14 випадків (0,26 % - 5306). Кількість зареєстрованих смертей від термінальної стадії ВІЛ-інфекції у Чернівецькій області за I півріччя 2014-2015 рр. становило по 8 осіб в рік, що складає 0,53 % (1497) від загальної кількості померлих від термінальної стадії ВІЛ-інфекції по Україні станом на 01.07.2015 р. та 0,49 % (1629) за I півріччя 2014р.

На обліку у Чернівецькій обл. за I півріччя 2014-2015 рр. знаходилося відповідно 223 і 325 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих жінок, що становило 0,52 % (42655) і 0,71 % (45527) від загальної кількості по Україні. Кількість осіб, які отримують високоактивну антиретровірусну терапію (ВААРТ) у Чернівецькій обл. становить відповідно 346 (0,56 % - 61713) і 404 (0,65 % - 62590).

В області і надалі залишається проблема Ко-інфекції ВІЛ/ТБ. Обидві хвороби негативно впливають на стан імунної системи та уражуючи клітини лімфатичної системи, підсилюють одна одну, створюючи смертельний тандем. На сьогодні, в регіоні туберкульоз став найпоширенішою опортуністичною хворобою при ВІЛ-інфекції та основною причиною розвитку СНІДу й смерті від СНІДу. Про це, свідчать дані, що з 31 нових випадків СНІД 28 – туберкульоз, з них 18 - це ВДТБ. 20 людей з Ко-інфекцією є бактеріовидільовачами.

Найвищий показник поширеності на ВІЛ-інфекцію в Герцаївському районі 272,6 на 100 тисяч населення, м. Чернівці

(128,9), м. Новодністровськ (155,6), Сокирянському районі (70,7). Слід відмітити, що у Герцаївському районі у Святовознесенському монастирі перебувають 82 ВІЛ-інфікованих дітей під опікою владики Михайла Лонгіна та всі крім однієї дитини отримують антиретровірусну терапію.

В Сокирянському районі є виправна колонія, де на сьогодні перебуває 13 ВІЛ-інфікованих засуджених осіб, 4 з яких приймають антиретровірусну терапію. Майже всі вони прибули з інших регіонів України.

В першому півріччі 2015 року в місцях позбавлення волі за кодом 112 було виявлено 4 ВІЛ-позитивних людей, проте на облік жодного не поставлено. Крім того, під час звірки з'ясовано, що кількість ВІЛ-інфікованих в Сокирянській виправній колонії різняться з даними обласного центру.

Станом на 01.07.15р. ВААРТ отримує 404 ВІЛ-інфікованих пацієнтів, з них 313 - дорослі та 91 - діти. Смертність серед людей, які приймають ВААРТ значно нижча, ніж серед пацієнтів, що її не отримують. З усіх 13 померлих: 9 осіб приймали ВААРТ, з них 3 людей отримували таку терапію більше одного року, інші шестеро – терапію відчаю, 4 - потребували ВААРТ, але не отримували. 7 ВІЛ-інфікованих осіб, що померли, були з Ко-інфекцією ВІЛ/ТБ.

Висновки. За перше півріччя 2014-2015рр. у Чернівецькій області спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію, але все-таки відображається негативна динаміка, щодо захворюваності на термінальну стадію ВІЛ-інфекції. З огляду на вирішення проблеми ВІЛ/СНІДУ, як медико-соціальної проблеми – Чернівецькій області вдалося домогтися суттєвого успіху в стабілізації епідемії.