

## **ПРИЧИНИ ЛЕТАЛЬНОСТІ У ХВОРИХ НА ОПІКОВУ ХВОРОБУ**

*Хоппестад Н., Михайленко С.М.,*

*П'ятигор В.О., студ. 3-го курсу*

*Науковий керівник – асист. Мадяр В.В.*

*СумДУ, медичний інститут, кафедра загальної хірургії*

В останні роки в Україні кількість хворих на опікову хворобу залишається достатньо високою. Спостерігається зростання відсотку травмованих літнього та старечого віку (з 10% до 17-19%).

В Сумській області за період 2005 та 2006 років госпіталізовано 1806 попечених, із яких 53 померли. Смертність особливо підвищується при поєднанні значної за площею поверхні опіків з літнім віком постраждалих, супутніми захворюваннями та ускладненнями.

У наше клінічне дослідження було включено 27 пацієнтів, які померли в опіковому відділенні СОКЛ за період 2005-2006 рр. Серед них 16 чоловіків та 11 жінок: 24 (89%) хворих отримали опіки полум'ям, 1 (3%) – окропом, 2 (6%) – контактним шляхом. Найбільший відсоток серед постраждалих становлять чоловіки – 16 (60%), а жінки – 11 (40%). За віком постраждали старші за 60 років складають 12 (44%), віком від 14 до 35 років - 3 (11%) та 12 (44%) віком від 35 до 60 років. Наступним показником є площа та глибина опіку, 14 (52%) становлять пацієнти з загальною площею опіків більше 30% та площею глибоких опіків – від 10 до 30% - 17 пацієнтів, що складає (63%).

Наступні дані про ускладнення, що зустрічаються найчастіше у хворих на опікову хворобу засвідчують, що померлі з поліорганною недостатністю становлять 22 (81,5%) пацієнти. Найчастіше вражаються такі органи, як серце (гостра серцева недостатність) – 24 (89%), печінка (токсичний гепатит) – 20 (74%), нирки (гостра ниркова недостатність) – 17 (63%). Надзвичайно високим є відсоток хворих із таким ускладненням як пневмонія, частіше двобічна – 20 (74%). Крім того, з набряком легень зустрілось – 7 (26%), з недостатністю мозкового кровообігу – 15 (55,5%), сепсисом – 7 (26%).

На основі отриманих даних нами зроблено висновки, що найбільш загрозливими ускладненнями опікової хвороби є поліорганна недостатність, яка зумовлена вкрай тяжкою інтоксикацією, а також пневмонія, токсичний гепатит, гостра серцева недостатність та сепсис. Зазначені ускладнення, супутні захворювання, площа та глибина опіків, вік хворих є основними причинами смерті у хворих на опікову хворобу.

Беручи до уваги результати наших досліджень, потрібно наголосити на необхідності удосконалення своєчасної діагностики, профілактичних заходів попередження ускладнень у хворих на опікову хворобу.