

## **КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ САЛЬМОНЕЛЬОЗУ**

*Яремчук Т.В., лікар-інтерн  
Науковий керівник – д-р мед. наук Чемиш М.Д.  
СумДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Серед гострих кишкових інфекцій з кожним роком все більшого значення набувають сальмонельози. Епідеміологічна ситуація з захворюваності на сальмонельози визначається як несприятлива й має тенденцію до погіршення .

Мета дослідження - вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу сальмонельозу в сучасних умовах. Проведено ретроспективний аналіз 54 історій хвороб хворих на сальмонельоз, що знаходились на лікуванні в інфекційному відділенні Охтирської ЦРЛ у 2004-2006 рр. Вік обстежених коливався від 2 до 30 років. Осіб жіночої статі було – 46,5 %, чоловічої – 53,5 %, з них дітей – 29,4 %. Мешканці сільської місцевості становили 52,3 %, міської – 94,7 %. Найчастіше діагностували гастроентеритний варіант перебігу сальмонельозу (61,1 %), рідше гастроентероколітний (31,5 %) та ентероколітний (7,4 %). У 90,7 % осіб захворювання мало середньотяжкий, у 5,6 % - тяжкий , у 3,7 % - легкий перебіг. Бактеріологічно діагноз підтверджено в усіх хворих: у 94,5 % захворювання було викликано *S. enteritidis*, у 5,5 % - *S. typhimurium*. Бактеріоносійство встановлено у 9,3 %, з них *S. enteritidis* - у 7,4 %, *S.typhimurium* – у 1,9 % .

Таким чином, в Охтирському районі в 2004-2006 рр. сальмонельози виникли частіше у осіб молодого віку. Захворювання спричиняла переважно *S. Enteritidis*, переважали гастроентеритний та гастроентероколітний варіанти середньотяжкого ступеня.