

ЧАСТОТА УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ НА ОПІКОВУ ХВОРОБУ

*Снегір'ова І.О., Калуцька Н.Г., Гусєва І.О.,
Рашевська В.А., Ілляшенко О.Л., студ. 3-го курсу
Науковий керівник – асист. Мадяр В.В.*

СумДУ, медичний інститут, кафедра загальної хірургії

У Сумській області за період 2005-2006 рр. було госпіталізовано 1806 обпечених, із яких у 126 (7%) пацієнтів травма ускладнилася опіковою хворобою. У 108 (85,8%) із хворих на опікову хворобу в анамнезі не було хронічних захворювань і тільки у 18 (14,2%) виявлені такі. 27 (21,4%) від усіх обпечених з опіковою хворобою загинули. Серед хворих, у яких виникли ускладнення опікової хвороби, відсоток померлих склав 54.

Серед 126 пацієнтів з опіковою хворобою 75 (59,5%) були чоловіки і 51 (40,5%) жінки. За віком <7 років – 29 (23%), 7-14 років – 8 (6,4%), 14-35 років – 26 (20,6%), 35-60 років - 50 (39,7%), 60-70 років - 5 (3,9%), >70 років - 8 (6,4%). Опіки полум'я отримали 55 (43,7%), окропом – 60 (47,6%), парою – 7 (5,5%), іншими агентами (контактний, хімічний) – 4 (3,1%). Загальна площа опіків >10% виявлена у 12 (9,5%) пацієнтів, 10-30% - у 80 (63,5%), >30% - у 34 (27%).

Наступні данні дають нам змогу виявити кореляцію між розвитком ускладнень і наявністю опікової хвороби. Найчастіше завдяки адекватно і вчасно проведеним заходам вдалось попередити їх розвиток ускладнень у 76 пацієнтів, що складає 60,3%. Відносно тих пацієнтів, у яких вони виникли, виявляється наступне співвідношення між розвитком їх: опікове виснаження – 26 (12%), поліорганна недостатність – 24 (11%), пневмонія – 22 (10%), сепсис – 14 (16,4%), анемія – 10 (4,6%), ТЕЛА – 4 (1,8%). Найчастіше зустрічаються поєднання токсичного гепатиту, гострої серцевої та ниркової недостатностей, що ми виявили у 40 (18,2%) пацієнтів з опіковою хворобою.

Дослідження вказують на необхідність в подальшому вивченні питань ранньої діагностики та проведення своєчасних профілактичних заходів по ліквідації ускладнень у хворих на опікову хворобу для зниження летальності та кількості хворих з важким перебігом опікової травми.