

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЕРЛІТІОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

*Білик О.П., Смірнова В.Ю., студ. 5-го курсу
Науковий керівник – Захлебаєва В.В.
Сум ДУ, медичний інститут, кафедра інфекційних хвороб*

Тенденція до збільшення захворювань на хронічні вірусні гепатити – одна із головних проблем сучасної медицини. Тому актуальним є пошуки більш ефективних методів лікування. В останні роки в комплексному лікуванні хронічних вірусних гепатитів все частіше застосовують берлітрон.

Берлітрон – це препарат, який містить у своєму складі ліпоеву кислоту. Він впливає на обмін холестерину, має ліпотропний та дезінтоксикаційний ефекти, покращує функції печінки.

З метою дослідження ефективності використання берлітону був проведений ретроспективний аналіз 40 історій хвороб пацієнтів, що знаходилися на лікуванні в СОКІЛ у 2005–2006 роках з хронічними вірусними гепатитами. Хворі були розподілені на 2 групи: основна група – 20 пацієнтів (10 чоловіків, 10 жінок), які приймали берлітрон; контрольна група – 20 хворих (10 чоловіків, 10 жінок), які отримували традиційну терапію. Проведений аналіз показав, що середня тривалість лікування хворих, які приймали берлітрон, складала у чоловіків 12,4 дні, у жінок 9,6. Нормалізація біохімічних показників спостерігалась у чоловіків через 8,8; у жінок 6,6. У контрольній групі середня тривалість лікування складала у чоловіків 14,5 днів, у жінок - 15,4, нормалізація біохімічних показників спостерігалась через 13,8 та 11,9 відповідно.

Таким чином, застосування берлітону у комплексному лікуванні хронічних вірусних гепатитів є доцільним, так як сприяє більш швидкій ремісії.